

Heumilch

EINFACH URGUT.

Gräser- und Kräuterfibel

50 wertvolle Alpenpflanzen entdecken.

Ausgezeichnet als „garantiert traditionelle Spezialität“.



„Mit jedem Schritt und Tritt, welchen wir
in der Natur machen, begegnen wir immer
wieder neuen Pflanzen, die für uns höchst
nützlich und heilbringend sind.“

Sebastian Anton Kneipp



EINFACH URGUT.

Inhalt

Vorwort Karl Neuhofer.....	5
Vorwort Sepp Forcher.....	7
Im Einklang mit der Natur.....	8
Heumilch schont die Umwelt.....	12
Artenreiches Futter für genussvolle Produkte.....	20
Pflanzen entdecken.....	22
Quellenverzeichnis.....	78
Glossar.....	79
Pflanzenverzeichnis.....	84
Impressum.....	86



Heumilch

EINFACH URGUT.

Artenreichtum erhalten

Sie halten die Gräser- und Kräuterfibel der ARGE Heumilch in den Händen. Mit dieser Fibel, die wir zusammen mit Dr. Konrad Pagitz vom Botanischen Institut der Universität Innsbruck gestaltet haben, wollen wir Ihnen aus erster Hand zeigen, welche Vielfalt unsere Heumilchkühe auf den heimischen Wiesen, Weiden und Almen vorfinden.


Am Menüplan jeder Heumilchkuh steht eine Vielzahl an verschiedenen Gräsern und Kräutern. Dieses artenreiche Futter trägt maßgeblich zur Qualität der Heumilch bei, die wiederum der Rohstoff für viele Spezialitäten ist. Die Fibel hilft Ihnen, die einzelnen Kräuter bei einer Wiesen- oder Almwanderung zu entdecken, und erklärt Wissenswertes über die Pflanzen – und natürlich auch über die Heumilch selbst. Ich wünsche Ihnen im Namen der ARGE Heumilch eine informative Lektüre!



Ihr

Karl Neuhofer

Obmann ARGE Heumilch
Heumilchbauer



Heumilch


EINFACH URGUT.

Vielfalt entdecken

Sie ist da, die Gräser- und Kräuterfibel, und es wird ein Ende haben mit der Unwissenheit über die grünende Welt außerhalb des Ozeans der Kochbücher und Rezepte.


Wer diese Fibel liest, wird nachdenklich und sich wundern, dass man bis jetzt so viel Lebensvielfalt mit eben so viel Geringschätzung bedacht hat.

Ihr



Sepp Forcher

Botschafter für Artenvielfalt



Heumilch

EINFACH URGUT.

Im Einklang mit der Natur

Die Heuwirtschaft ist die ursprünglichste Form der Milcherzeugung. Seit Jahrhunderten erfolgt die Fütterung der Milchkühe angepasst an den Lauf der Jahreszeiten.



Im Sommer kommen Heumilchkühe auf die Weiden und Almen, dort genießen sie frische Luft, klares Wasser und eine Vielzahl von saftigen Gräsern und Kräutern. Währenddessen beginnt im Tal die Heuernte, die Wiesen werden gemäht, das Gras getrocknet und das so gewonnene Heu in Scheunen gelagert. Im Winter werden die Tiere mit dem Heu gefüttert. Als Ergänzung erhalten sie mineralstoffreichen Getreideschrot. Vergorene Futtermittel wie Silage sind strengstens verboten.



Hauptproduktionsgebiet der Heumilch ist der europäische Alpenraum, in dem Heumilchbauern und Verarbeiter wertvolle Heumilch erzeugen und köstliche Heumilchprodukte produzieren. Nur Produkte mit dem Heumilch-Logo erfüllen diese sehr strengen Bestimmungen und werden kontrolliert gentechnikfrei hergestellt.

Unsere Qualitätsrichtlinien

Heumilchbauern und Verarbeiter erzeugen wertvolle Heumilch und produzieren köstliche Heumilchprodukte. Sie arbeiten nach dem Heumilch-Regulativ, dessen Einhaltung von unabhängigen, staatlich zertifizierten Stellen kontrolliert wird.

Europaweit einzigartig

Das strenge Regulativ überzeugte auch die Europäische Union. Sie hat Heumilch mit dem EU-Gütesiegel g.t.S. – garantiert traditionelle Spezialität – ausgezeichnet. Das Siegel gewährleistet eine traditionelle Zusammensetzung bzw. ein

traditionelles Herstellungsverfahren eines Lebensmittels. Damit garantiert dieses Zeichen ein Geschmackserlebnis auf hohem Qualitätsniveau, bedingt durch strenge Prüfverfahren und regelmäßige Kontrollen. Heumilch g.t.S. ist somit für Konsumenten ein Garant für noch mehr Qualität und Unverfälschtheit. In Europa erfüllen weniger als 3% der erzeugten Milch die Kriterien der Heumilch.



Die wichtigsten Kriterien des Heumilch-Regulativs

- Artgemäße Fütterung im Jahresverlauf: Heumilchkühe bekommen frische Gräser und Kräuter im Sommer sowie Heu im Winter.
- Vergorene Futtermittel sind strengstens verboten.
- Zum Wohl der Tiere ist eine dauernde Anbindehaltung verboten. Für ausreichend Bewegung sorgen Laufställe, Auslauf oder Weide.
- Die traditionelle Wirtschaftsweise der Heumilchbauern schützt die Umwelt und fördert die Artenvielfalt.
- Heumilch ist aufgrund ihrer hohen Qualität für die Herstellung von Käsespezialitäten geeignet.
- Heumilch ist kontrolliert gentechnikfrei und wird von unabhängigen Kontrollstellen zertifiziert.
- Die Heuwirtschaft wurde von der Europäischen Union mit dem EU-Gütesiegel g.t.S. – garantiert traditionelle Spezialität – ausgezeichnet.



Heumilch

EINFACH URGUT.

Heumilch schont die Umwelt

Durch die nachhaltige Wirtschaftsweise tragen Heumilchbauern wesentlich zum Schutz der Umwelt und Artenvielfalt bei.



Nachhaltiges, auf Generationen aufgebautes Denken und Handeln prägt seit jeher die Heuwirtschaft. Rund 95% der Heumilchregionen befinden sich in den Alpen, wo diese Wirtschaftsweise seit Jahrhunderten Tradition hat. Die Ergebnisse einer Studie der Universität für Bodenkultur in Wien zeigen auf, dass Heumilchbauern entscheidend zum Schutz der Umwelt und Artenvielfalt beitragen.



„Der Verlust der biologischen Vielfalt zählt neben dem Klimawandel zu den größten und zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Die Hauptgründe

für den dramatischen Verlust von Arten und Lebensräumen sind nicht standortangepasste Nutzung und vor allem der Nutzungswandel in der Landwirtschaft. Mit dem Silageverzicht setzen die Heumilchbauern ein klares Zeichen für eine standortangepasste und weniger intensive Grünlandnutzung.“

Marion Hammerl,
Geschäftsführerin Bodenseestiftung

Förderung der Artenvielfalt

Eine Vielzahl an Gräsern und Kräutern wachsen auf den Wiesen, Weiden und Almen in den Heumilchregionen. Um diesen Artenreichtum zu erhalten, ist eine entsprechend extensive Bewirtschaftung notwendig. Das Grasens der Heumilchkühe auf den Grünflächen sorgt für Wachstumsimpulse der Pflanzen, somit ist keine permanente Nachsaat notwendig. Außerdem erfordert die hohe Pflanzenvielfalt weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel als bei intensiv genutzten Flächen.

Zur Förderung der Artenvielfalt lassen Heumilchbauern ihre Wiesen richtig

reifen und mähen erst, wenn eine Vielzahl von Gräsern und Kräutern in voller Blüte stehen. Sie haben daher um ein bis zwei Schnitte pro Sommer weniger.

Auch weniger ertragreiche Flächen wie Magerwiesen, Trockenrasen und Nasswiesen, die man häufig im Berggebiet antrifft, werden von Heumilchbauern bewirtschaftet, denn auch auf diesen Flächen gedeihen unterschiedliche Gräser- und Kräuterarten. Sie sind ein wahres Schlaraffenland für die Heumilchkühe und werden durch die Heuwirtschaft gepflegt.



Mosaikartige Bewirtschaftung




Tiere wie Bienen, Hummeln oder Niederwild profitieren von der mosaikartigen Bewirtschaftung, wie sie bei der Heuwirtschaft betrieben wird. Die Mahdzeitpunkte sind zeitlich gestaffelt und werden räumlich an den unterschiedlichen Flächen angewendet. Durch diese kleinflächige, mosaikar-

tige Bewirtschaftung werden nie alle Grünflächen auf einmal gemäht, sondern in einzelnen Wellen bewirtschaftet. So bleiben wichtige Nahrungsquellen und Rückzugsräume für Kleintiere erhalten, bis die Pflanzen auf den bereits gemähten Wiesen wieder genügend hoch sind.



Schutz vor Verdunkelung



Eine einzige Kuh hält mehr als einen halben Hektar Grünland frei.
Das ist in etwa so viel wie ein Fußballfeld!

Aufgrund der traditionellen wirtschaftlichen Nutzung der Berggebiete und Almen durch Heumilchbauern wird verhindert, dass sich der Wald willkürlich auf Wiesen und Weiden

ausbreiten kann. Die Wege bleiben offen und die Landschaft wird gepflegt. Nur so kann der Weiterbestand von vielen seltenen Pflanzenarten ermöglicht werden.

Ohne Heumilchbauern verdunkelt die Landschaft.



Zeitpunkt der Nutzungsauflassung



60-80 Jahre später

Schutz vor Umweltkatastrophen

Lawinen keine Chance

Durch das regelmäßige Mähen und Weiden entstehen gepflegte Wiesen mit kurzem Bewuchs, die den Schnee besser halten. Die durch die Bewirtschaftung vorhandene hohe Pflanzenvielfalt sorgt für einen tief verwurzelten Grasteppich, der auch ungünstigen Witterungsbedingungen standhält und Erdrutschen besser entgegenhalten kann. Unbewirtschaftete Wiesen mit langen, ungemähten Gräsern werden von der Schneelast zu Boden gedrückt und sind ideale Rutschrampen, auf denen sich Schneebretter leicht lösen und zur unberechenbaren Lawinengefahr werden können.

Ein Teil unserer Kultur

Im Sommer bewirtschaften viele Heumilchbauern neben Grünland zusätzlich die Almflächen. Gerade in den Steil- und Berglagen der Alpenregionen ist dabei viel Handarbeit notwendig. Ohne die wertvolle Arbeit der Heumilchbauern wäre unsere Kulturlandschaft in den Bergen, wie wir sie heute kennen, innerhalb von 60 bis 80 Jahren aufgrund von Verdunkelung verschwunden. Das Bewirtschaften der Grünflächen verhindert auch Umweltkatastrophen wie Murenabgänge und Erdrutsche.



Schonung von Ressourcen

Unsere Heumilchbauern schonen durch ihre extensive Wirtschaftsweise lebensnotwendige und wertvolle Ressourcen wie Getreide und Wasser, da man auf artgemäße Fütterung setzt.

Wiederkäuer wie Kühe benötigen Getreide als Futterquelle zur Produktion von Milch und Fleisch gar nicht. Ihr

Verdauungstrakt ist so aufgebaut, dass er Gräser und Kräuter im frischen, aber auch im getrockneten Zustand als Heu, verarbeiten kann. Kühe können das Eiweiß und die Energie in Form von Gras und Heu direkt von der Wiese verwerten und gleichzeitig für den Menschen hochwertige Lebensmittel erzeugen.



In der industrialisierten Landwirtschaft frisst eine Kuh die Menge an Getreide, von der sich drei Menschen ernähren können. Bei der Heuwirtschaft setzt man hingegen auf artgemäße Fütterung.

Förderung der Humusbildung

Nachhaltige Grünlandnutzung führt zu einem hohen Humusgehalt im Boden, welcher ein sehr guter Speicher für Kohlendioxid ist. Humus bildet sich ganz natürlich durch abgestorbene Pflanzenteile im Grünland. Er bindet die im Boden liegenden

enormen Mengen an CO₂, die sonst in die Erdatmosphäre entweichen und den Klimawandel beschleunigen. Außerdem speichern humusreiche Böden mehr Wasser und können damit längere Trockenperioden überdauern.

Wasserfußabdruck

Der Wasserfußabdruck der Milch hängt sehr stark vom System ab, in dem die Milch produziert wird. Werden Milchkühe nur im Stall gehalten und mit großen Mengen an zugekauften Futtermitteln – wie Sojabohnen, Mais und Getreide – versorgt, die oft über weite Strecken transportiert wer-

den, erhöht sich der Wasserfußabdruck deutlich. Milchproduktion auf Basis lokal erzeugten Grünlandfutters wie Gras und Heu verringert den Wasserfußabdruck der Milch und trägt daher zur Schonung der Ressource Wasser bei.




„Industrialisierte Landwirtschaft hat einen rund dreimal so großen Wasserfußabdruck wie die Heuwirtschaft.“

Ao. Univ.-Prof. Dr. Werner Zollitsch,
Universität für Bodenkultur Wien



Bei der Berechnung des Wasserfußabdruckes wird nicht nur der Wasserverbrauch für die Herstellung und Verarbeitung eines Produktes berücksichtigt, sondern auch weitere Faktoren wie Transport, Nutzung und insbesondere die Beeinträchtigung der Wasserqualität. Besonders kritisch ist dabei, wenn Wasser beim Verbrauch den regionalen Wasserkreisläufen entzogen wird und verloren geht.



Heumilch

EINFACH URGUT.

Artenreiches Futter für genussvolle Produkte

Aroma- und artenreiches Futter auf dem
Speiseplan der Heumilchkühe trägt maßgeblich
zur Qualität der Milch bei.



Je höher der Artenreichtum im Futter ist, desto höher sind die Qualität und das Aroma der Milch. Das schmecken nicht nur unsere Kühe. Auch zahlreiche Geschmackstests und Blindverkostungen bestätigen diesen Unterschied.

Heumilchprodukte haben einen rund doppelt so hohen Wert an Omega-3-Fettsäuren und konjugierten Linolsäuren (CLA) als normale, herkömmliche Milchprodukte. Dies bestätigt eine Studie der Universität für Bodenkultur. Omega-3-Fettsäuren zählen zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die unser Körper nicht selbst produzieren kann. Da sie aber lebensnotwendig sind, müssen wir sie mit der Nahrung zuführen. Heumilchprodukte sollten daher in keinem Ernährungsplan als Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils fehlen.

Käsemeister schwören seit jeher auf die besondere Güte der Heumilch. Denn durch den konsequenten Verzicht auf vergorene Futtermittel kann Käse ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und ohne intensive mechanische Behandlung hergestellt werden. Länger gereifte Käse lassen sich nur aus einem hochwertigen Rohstoff herstellen.

Heumilch besitzt diese Eigenschaft und ist daher der ideale Rohstoff für Käsespezialitäten. So muss Bergkäse mit dem EU-Schutz „g.U.“ – geschützte Ursprungsbezeichnung – aus Heumilch hergestellt werden.

Heumilch

EINFACH URGUT.


Pflanzen entdecken

Entdecken Sie heimische Pflanzenarten. Neben Informationen zum Aussehen der Pflanze finden Sie auf den folgenden Seiten Hinweise auf Vorkommen, allfällige Verwendung und Besonderheiten.

Die porträtierten Pflanzen sind in erster Linie häufige und weit verbreitete Arten. Es finden sich aber auch einzelne seltene Arten, deren Vorkommen auf ökologisch höchst wertvolle Flächen hinweist. Die Beschränkung auf 50 Arten aus etlichen Hundert, die im Grünland vorkommen, kann natürlich nur eine beispielhafte Auswahl ergeben.

Ich freue mich, wenn diese Fibel Leserinnen und Leser dazu anregt, mehr über die Vielfalt unserer heimischen Pflanzenwelt erfahren zu wollen.

Ihr



Konrad Pagitz

Univ.-Ass. Prof. Dr.

Botanisches Institut Innsbruck



Wiesen und Weiden

Wiesen und Weiden sind große landschaftsprägende Elemente. Ausgedehnte, von Gräsern geprägte Grünlandflächen sind in unserem Lebensraum jedoch erst durch den Menschen unter Zurückdrängung des Waldes geschaffen worden. Natürliches Grünland gab und gibt es nur an nicht waldfähigen Standorten, entweder oberhalb der Waldgrenze und in Lawenstrichen oder auf zu (stau-)nassen Böden wie Röhrichten, Mooren, Sümpfen oder bach- bzw. flussbegleitenden krautreichen Staudenfluren.

Am Beginn der Entwicklung hin zum Grünland stand die Waldweide, die zum Auflichten des Waldes sowie zum Zurückdrängen von Jungbäumen und Sträuchern führte. Gleichzeitig wurden verbiss- und tritttolerante, krautige Pflanzenarten gefördert. Wiesen entwickelten sich erst danach aus der

Rodung von Waldflächen und aus der Verlängerung der Brachzeiten von Äckern. Acker- und Grünlandnutzung waren jedoch lange Zeit eng verknüpft. Eine effiziente Nutzung von Wiesen war erst mit der Erfindung entsprechender Mähwerkzeuge wie der Sense gegeben. Wiesen wurden im Alpenraum vermutlich seit der Eiszeit genutzt. Ab dem Mittelalter trennten sich Ackerbau und Grünlandwirtschaft zunehmend. Damit wurde die Entwicklung hin zu intensiver bewirtschafteten Weiden und Wiesen eingeleitet.

Heute entfallen auf Grünland ca. 20 Prozent der Fläche Österreichs. Damit ist ein sehr großer Teil ehemaligen Waldgebietes in eine von Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft umgeformt. Im Zuge der Kulturnahme entstanden oftmals sehr artenreiche Grünlandgesellschaften, vor allem so-



lange die Nutzung nicht zu intensiv wurde (Magerwiesen). Mit zunehmender Technisierung und Düngung entstanden mehrschürige Fett- und Intensivwiesen.

Wiesen und Weiden bedecken große Flächenanteile und sie beherbergen eine große Vielzahl an Gräser- und Kräuter-Arten. Für deren Erhaltung ist eine entsprechende nachhaltige Bewirtschaftung notwendig. Diese Aufgabe wird von der Grünlandwirtschaft übernommen. Es gilt hier also, den schwierigen Spagat zu schaffen, Diversität und Genressourcen zu erhalten und andererseits wirtschaftliches Agieren zu ermöglichen. Landwirtschaftliche Betriebe, die traditionelle Heuwirtschaft betreiben, spielen hier eine maßgebliche Rolle.

In dieser Broschüre wird eine Auswahl von 50 Pflanzenarten kurz vorgestellt. Neben Informationen zum Aussehen der Pflanze finden sich Hinweise auf Vorkommen, allfällige Verwendungen und Besonderheiten. Bei den porträtierten Pflanzen handelt es sich in erster Linie um häufige und weit verbreitete Arten. Es finden sich aber auch einzelne seltene Arten, deren Vorkommen auf ökologisch höchst wertvolle Flächen hinweist. Mit 50 Arten von etlichen Hundert, die im Grünland vorkommen, ist die Auswahl sehr beschränkt und beispielhaft. Es wurde aber dennoch darauf geachtet, dass jeweils exemplarisch Arten von nass bis trocken, stickstoffreich bis mager und vom Tal bis ins Gebirge berücksichtigt werden. Nicht zuletzt sollen die Leserinnen und Leser dazu animiert werden, selbstständig weiter zu recherchieren.



Von Gräsern, Kräutern und Leguminosen

Für die Landwirtschaft zählt naturgemäß die Futterqualität einer Wiese. Daher werden auch die Grünlandpflanzen nach ihrem Nährstoffgehalt grob in Gräser, Kräuter und Leguminosen eingeteilt.

- ✓ **GRÄSER** liefern in erster Linie die notwendige Energie in Form von Kohlehydraten.
- ✓ **LEGUMINOSEN** sind bedeutsam für die Proteinversorgung.
- ✓ **KRÄUTER** im landwirtschaftlichen Sinn zeichnen sich durch hohen Mineralstoffgehalt und zahlreiche sekundäre Inhaltsstoffe aus.

Ein ausgewogenes Verhältnis aller Komponenten ist daher für die Heuwiesen von großer Bedeutung.




Kleine Typologie der Wiesen

So vielfältig wie die Gräser und Kräuter, so vielfältig sind auch die Wiesen selbst. Je nachdem, wie hoch der Nährstoffgehalt des Bodens ist, wie feucht eine Wiese ist, wie sie genutzt wird (intensiv bis extensiv) und ob sie

im Tal oder in der Höhe liegt, unterscheidet man unterschiedliche Wiesentypen. Abhängig vom Wiesentyp sind natürlich das Vorkommen von Pflanzen und die Artenvielfalt unterschiedlich.

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, wo Sie welche Wiese finden können:



Acker-Witwenblume, Wiesenskabiose / *Knautia arvensis*



- Knaut** die Bezeichnung geht auf Christoph und Christian Knaut, ein deutsches Ärzte- und Botanikerbrüderpaar, zurück
- arvensis** *lat.* zum Acker gehörend
- Familie** Kardengewächse/Dipsacaceae
- Futtertyp** Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Acker-Witwenblume ist eine mehrjährige krautige Pflanze. Sie wird etwa 25 - 75 cm hoch. Die Blattspreite der Grundblätter ist meist ungeteilt, die Stängelblätter sind gegenständig und fiedelförmig geteilt. Die zahlreichen Blüten sind in Köpfchen zusammengefasst und von einer grünen Hülle umgeben. Die vier Kronblätter der einzelnen Blüten sind verwachsen. Die Blüten sind vorwiegend männlich, d. h. die männlichen Blütenorgane reifen vor den weiblichen, um eine Selbstbestäubung zu verhindern.

Die Blüten sind sehr attraktiv für verschiedenste Besucher. Häufig anzutreffen sind vor allem Widderchen, auch Blutströpfchen genannt, aus der Familie der Schmetterlinge, die schon durch ihre schwarz-rote Färbung auf ihre Giftigkeit hinweisen. Auch Honigbienen sind oft beim Nektarsammeln anzutreffen. Diese Bienen tragen als Besonderheit anstatt der sonst gelben Pollenhörschen lilafarbene.

Die Samen besitzen sogenannte Elaiosomen, das sind eiweißreiche Anhängsel, die gerne von Ameisen zur Fütterung ihrer Brut in die Nester verschleppt werden. So leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung der Pflanze.

VORKOMMEN

Die Acker-Witwenblume ist überall in Mitteleuropa auf nährstoffreichen, eher trockenen Wiesen, gerne über kalkreichem Untergrund verbreitet.

WIRKUNG

Als Futterpflanze ist die Witwenblume absolut ungiftig und eine willkommene Abwechslung, die gerne gefressen wird. Das Kraut wird auch als Wildgemüse gesammelt.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Fundort

Arznei-Quendel, Feld-Thymian / *Thymus pulegioides*



- thymos** *griech.* Lebensenergie, Kraft
- pulex** *lat.* Floh, intensiv riechendes Kraut zum Vertreiben von Ungeziefer
- Familie** Lippenblütler/Lamiaceae
- Futtertyp** Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Feld-Thymian ist ein kriechender Zwergstrauch mit einer verholzten Stängelbasis. Er wächst 5 - 25 cm hoch und wurzelt bis zu 100 cm tief. Die Stängel sind vor allem knapp unter den endständigen Blütenständen scharf vierkantig. Die Blätter sind derb-lederartig, immergrün und zum Teil behaart. Der stark aromatische Geruch stammt von den ätherischen Ölen, die in die Blätter eingesenkte Öldrüsen herstellen und die der Pflanze vor allem als Verdunstungsschutz dienen. Die Blüten duften durch den reichlich produzierten Nektar stark und locken sehr zahlreich Insekten, vor allem Bienen, an.

VORKOMMEN

Der Feld-Thymian bevorzugt Magerrasen und Magerweiden, ferner wächst er an Böschungen, in Kiesgruben oder an Felsen. Man findet ihn an trockenen und warmen, basenreichen Stellen von der Ebene bis ins Hochgebirge.

WIRKUNG

Der Feld-Thymian zählt zu den wertvollsten Pflanzen in einer artenreichen Wiese oder Weide. Er ist eine von mehreren Thymian-Arten, die als Heilkraut schon seit der Antike bekannt sind.

Wirksam sind vor allem die ätherischen Öle und hier besonders das Thymol, das bakterizide und fungizide Eigenschaften hat. Thymiantee wirkt speziell als Hustenmittel, desinfizierend, krampflösend und auswurfördernd. Als Würzkraut wirkt er appetitanregend und verdauungsfördernd.

Das Thymol wird auch in der Veterinärmedizin bei Pilzbefall oder zur Verdauungsförderung verwendet. Auch die Imkerei schätzt die Wirkstoffe bei der Bekämpfung der Varroamilbe.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Fundort

Echter Kümmel / *Carum carvi*



karon griech. Kreuzkümmel, wurde später auf den Kümmel übertragen

Familie Doldenblütler/Apiaceae

Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Der als Gewürz bekannte Echte Kümmel ist eine zweiteilige Spaltfrucht. Mit der Blüte erreicht der Kümmel eine Höhe von 30 - 60 cm, unter günstigen Bedingungen werden es auch 120 cm. Der Echte Kümmel ist eine zweijährige Pflanze mit einer spindelförmigen Pfahlwurzel. Der daraus entwickelte ästig verzweigte Stängel trägt doppelt fiederteilige, fein zugespitzte Blätter. Die weißen kleinen Blüten sind in Dolden zusammengefasst.

VORKOMMEN

Der Echte Kümmel bevorzugt Fettwiesen und Fettweiden mit mäßiger Nährstoffversorgung und eher sauren Böden.

WIRKUNG

Kümmel ist eine der ältesten Gewürzpflanzen und wurde bereits steinzeitlich genutzt. Die Pflanzen enthalten sehr viel ätherisches Öl, das sich sehr positiv auf die Verdauung auswirkt und Verkrampfungen im Magen-Darm-Trakt löst. Auch die Vermehrung bestimmter Bakterien wird gehemmt, sodass z. B. Mundgeruch herabgesetzt werden kann.

Bei Koliken und Magenkrämpfen von Rindern wird der Kümmel auch in der Veterinärmedizin verwendet.

Aus den Früchten werden auch Branntweine und Liköre hergestellt.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Fundort
												Trockenwiese

Echt-Labkraut / *Galium verum*



gala griech. Milch

verum lat. echt

Familie Kaffeeengewächse/Rubiaceae

Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Das Echt-Labkraut ist eine Staupe. Es erreicht eine Höhe von ca. 10 - 70 cm. Der Stängel ist zumindest oben deutlich vierkantig und trägt zahlreiche Blattwirtel zu 6 - 12 Blättern.

Die Blätter selbst sind sehr schmal – linealisch, nadelartig, nur bis ca. 1 mm breit und bis zu 15 mm lang. Die Blattoberseiten sind stark glänzend, der Blattrand ist nach unten umgerollt und die Blattunterseiten sind wie der Stängel kurzhaarig und matt. Die kleinen, intensiv nach Honig duftenden Blüten weisen vier goldgelbe Kronblätter auf und sind zu dichten, schmalen Rispen an den Stängelenden zusammengefasst.

VORKOMMEN

Das Echt-Labkraut weist eine relativ große Amplitude verschiedener Standorte auf. Sie reicht von Trockenrasen über wechselfeuchte Magerwiesen bis hin zu Pfeifengraswiesen, wobei kalkreiche

Böden bevorzugt werden. Die Art gilt als Magerkeitszeiger mit eher geringem Futterwert. Die an Trockenheit angepasste Pflanze ist jedoch eine beliebte Bienenweide mit Hauptblüte während der Sommermonate.

WIRKUNG

Der Volksname Labkraut weist auf die meist historische Verwendung der Pflanze in der Käseherstellung hin. Labkraut-Arten enthalten das Ferment Lab, im Falle des Echt-Labkrautes bis zu 1 Prozent.

Weiters findet die Pflanze in der Volksmedizin Verwendung, vor allem als harntreibendes Mittel und bei Hauterkrankungen. Eine wissenschaftliche Bestätigung der Wirkung liegt jedoch nicht vor.

Seltener ist die Verwendung als Färbemittel, die Blüten färben gelb, die Wurzeln rot.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Fundort
												Trockenwiese

Echt-Wundklee / *Anthyllis vulneraria*



- anthos** *lat.* Blume, anthyllis ist die Verkleinerungsform
- vulnus** *lat.* Wunde
- Familie** Schmetterlingsblütler/Fabaceae
- Futtertyp** Leguminosen

BESCHREIBUNG

Der Wundklee ist eine sehr variable, ausdauernde Pflanze. Er erreicht eine Höhe von 5 - 80 cm. Die wechselständigen Blätter sind meist gefiedert, die Grundblätter von Pflanzen höherer Lagen oft einfach. Das Endblättchen ist dabei deutlich größer als die seitlichen Blättchen. Die Blüten sind zu kompakten, kopfigen Blütenständen zusammengefasst, die am Grund von Hochblättern umschlossen sind. Die bis 19 mm langen Blütenkronen sind sehr unterschiedlich gefärbt, von blassgelb über sattgelb bis orange und fast rötlich. Der Kelch ist nach dem Blühen etwas aufgeblasen und rauchgrau bis blass-weißlich gefärbt. Kelche und auch Krone sind manchmal rotspitzig.

Den Wundklee gibt es in mehreren verschiedenen Unterarten, die sich in der Wuchshöhe, der Anzahl der Teilblätter und der Farbe unterscheiden.

VORKOMMEN

Den Wundklee findet man an nährstoffarmen und trockenen Standorten, wie Halbtrocken- und Trockenrasen sowie Wäldern oder Rohböden.

WIRKUNG

Die Bezeichnung Wundklee bezieht sich auf die ehemals beliebte Verwendung als Wundmittel in der Volksheilkunde. Die Wirkung ist jedoch fraglich, möglicherweise geht die Anwendung auf die Signaturenlehre zurück. Das heißt, Merkmale der Pflanze wie die roten Flecken im Blütenbereich wurden auf ein Krankheitsbild umgedeutet, in diesem Fall Wunden.

Der Wundklee gilt als gute Futterpflanze, ist aber nur mäßig schnitttolerant (zwei Schnitte) und beweidungsfest. Düngung führt ebenfalls zu raschem Rückgang.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Fundort

Eigentliche Kartäuser-Nelke / *Dianthus carthusianorum*



- Dios anthos** *griech.* Blume des Zeus
- Carthusiani** Wortbedeutung „carthusiani“ weist auf die Kartäusermönche hin, in der gleichnamigen Landschaft in den Westalpen
- Familie** Nelkengewächse/Caryophyllaceae
- Futtertyp** Kräuter

BESCHREIBUNG

Die attraktive Kartäusernelke ist eine mehrjährige unverzweigte Pflanze. Sie erreicht eine Höhe von 15 - 45 cm. Die Kartäusernelke ist in fast jedem Klostergarten zu finden. Sie hat sehr schmale, linealische Blätter. Diese stehen, wie es für die Nelkengewächse charakteristisch ist, gegenständig und sind wie die ganze Pflanze unbehaart. Die fünfzähligen Blüten sind von braunen Hüllblättern umgeben und zu Köpfchen zusammengefasst.

VORKOMMEN

Die Kartäusernelke ist eine typische Pflanze warmer und trockener Kalkmagerrasen und Tresp-Halbtrockenrasen. Sie wird durch Intensivnutzung rasch zurückgedrängt.

WIRKUNG

Der Futterwert ist eher gering, sie ist aber als Tagfalterblume von großer Bedeutung für viele Schmetterlingsarten.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Fundort

Englisches Raygras, Dauer-Lolch / *Lolium perenne*



- Lolium** *lat.* Lolch, eine Grasart, einzelne Arten der Gattung werden von Pilzen befallen, die bei Genuss Schwindel auslösen
- perenne** *lat.* mehrjährig
- Familie** Süßgräser/Poaceae
- Futtertyp** Gräser

BESCHREIBUNG

Das Englische Raygras ist ein wintergrünes Gras, das mit Hilfe von Ausläufern dichte Rasen bildet. Die einzelnen Halme können bis 60 cm hoch werden, die Blätter werden bis 6 mm breit. Die Ährchen setzen sich aus 6 - 10 Blüten zusammen, die Spelzen tragen keine Grannen. Die Ährchen stehen mit ihrer schmalen Seite zum Stängel, im Gegensatz zu den verschiedenen Queckenarten.

VORKOMMEN

Die Art ist sehr häufig von den Tieflagen bis ins Mittelgebirge auf nährstoffreichen (vor allem mit Stickstoff angereicherten) und schweren Böden zu finden. Sehr häufig wird sie auch angesät, in stark genutzten Wiesen bildet sie oft Monokulturen. In höheren Lagen ist sie durch die Frostempfindlichkeit begrenzt zu finden.

WIRKUNG

Das Englische Raygras ist eine Futterpflanze von hohem Wert. Wegen der hohen Trittsistenz eignet sich dieses Gras sehr gut für Sport- und Freizeitrassen.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese

Fundort

Europäische Trollblume / *Trollius europaeus*



- trulleus** *lat.* rundes Gefäß
- Familie** Hahnenfußgewächse/Ranunculaceae
- Futtertyp** Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Trollblume ist eine mehrjährige krautige Pflanze. Sie erreicht eine Wuchshöhe von 20 - 60 cm. Die Trollblume besitzt ein Rhizom als Speicherorgan, aus dem ein oder mehrere Stängel entspringen. Diese und auch die tief geteilten Blätter sind vollkommen unbehaart. Sehr charakteristisch ist die Blüte in Form einer Kugel. Die Blütenhülle ist zusammengeneigt, an sie schließen spezielle Nektarblätter mit am Grund sitzenden Nektardrüsen an. Aus den vielen freien Fruchtblättern entwickeln sich nach der Befruchtung die charakteristischen Balgfrüchte.

VORKOMMEN

Die Trollblume ist auf nährstoffreichen und feuchten bis nassen Böden anzutreffen, sowohl in Tal- als auch in Berglagen. Durch Trockenlegung sind allerdings sehr viele Standorte mittlerweile verloren gegangen und die Trollblume ist ein zunehmend seltener Anblick geworden.

In den Alpen steht sie aus diesem Grund auch teilweise unter Naturschutz.

WIRKUNG

So wie alle Hahnenfußgewächse ist auch die Trollblume zumindest schwach giftig und wird vom Weidevieh gemieden. Beim Trocknen wird das giftige Protoanemonin abgebaut und ist im Heu somit unproblematisch.

Der Kontakt mit dem frischen Pflanzensaft kann Hautrötungen hervorrufen.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Nasswiese

Fundort

Frauenmantel-Arten / *Alchemilla*-Arten



Alchemilla Die Bezeichnung bezieht sich auf die Alchimisten, die sich des Taus auf dem Frauenmantel bedienten, der deutsche Name nimmt Bezug auf die Jungfrau Maria und deren Umhang

Familie Rosengewächse/Rosaceae

Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Frauenmantel ist eine mehrjährige Staude. Er erreicht eine Wuchshöhe von etwa 30 cm. Die Blätter sind lang gestielt, rund und sieben- bis elflappig mit handförmiger Nervatur und gezähntem Blattrand. Auf den Blättern bildet sich vor allem nachts ein Tautropfen in Form von Wasser, das aus speziellen Poren ausgeschieden wird. Die nur wenige Millimeter kleinen gelbgrünen Blüten stehen in verzweigten Blütenständen. Da sich der Frauenmantel auch ungeschlechtlich fortpflanzen kann, ist eine sehr große Formenfülle entstanden, die nur von Spezialisten unterschieden werden kann.

VORKOMMEN

Frauenmantel-Arten kommen in gut wasser- und nährstoffversorgten Wiesen, vor allem in höheren Lagen vor. Bei hohem Stickstoffangebot kann es zur Massentfaltung kommen.

WIRKUNG

Unter den Inhaltsstoffen von Bedeutung sind Flavonoide, Bitterstoffe und Gerbstoffe.

Im Besonderen wurde bei Tieren eine vollständige Wachstumshemmung von Mammatumoren durch Agrimoniin festgestellt. Extrakte und Tinkturen werden bei verschiedenen Erkrankungen des Verdauungstraktes bei Tieren eingesetzt.

Auch in der humanen Heilpflanzenpraxis finden Tees Anwendung zur Blutreinigung, bei Entzündungen des Rachenraumes und bei Verdauungsbeschwerden.

Durch den hohen Eiweißgehalt ist der Frauenmantel eine wertvolle Futterpflanze.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese, Feuchtwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------

Fundort

Gemeine Schafgarbe / *Achillea millefolium*



Achilleios griechischer Sagenheld, der mit der Schafgarbe Wunden geheilt haben soll

mille lat. tausend

folium lat. Blatt

Familie Korbblütler/Asteraceae

Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Gemeine Schafgarbe ist eine ausdauernde, krautige Pflanze. Sie erreicht eine Wuchshöhe von meist 7 - 70 cm. Die Gemeine Schafgarbe durchzieht die Wiesen mit langen unterirdischen Ausläufern, aus denen unverzweigte derbe Stängel austreiben. Die doppelt gefiederten und wechselständig stehenden Blätter riechen stark aromatisch. Die kleinen Blütenköpfe stehen in dichten schirmartigen Blütenständen. Die einzelnen Blütenköpfe setzen sich aus wenigen gelblich-weißen Röhrenblüten und meistens fünf weißen oder rosafarbenen Zungenblüten zusammen.

VORKOMMEN

Die Gemeine Schafgarbe ist eine typische Pflanze der warmen Wiesen, Weiden, Halbtrockenrasen und auch Äcker mit mittlerem Nährstoffgehalt.

WIRKUNG

Die Schafgarbe besitzt seit dem Mittelalter einen hohen Stellenwert und wurde

von Hildegard von Bingen im Besonderen zur Wundheilung eingesetzt. Die Benediktiner verwendeten sie noch vor dem Hopfen als Hefewürze beim Bierbrauen.

Als Färbemittel ist sie für gelbe und moosgrüne Töne verantwortlich. Im Brauchtum ist sie vielerorts Bestandteil des Gründonnerstagsgemüses oder von Suppen, die vor Krankheiten bewahren und Kraft geben sollen.

Die Gemeine Schafgarbe enthält ätherische Öle, Bitterstoffe und Gerbstoffe. Diese regen die Verdauungssäfte an und helfen bei Krämpfen im Magen-Darm-Bereich bei Mensch und Tier. Instinktiv wird sie besonders von erkrankten Schafen gerne gefressen.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Fundort

Gemeines Ruchgras / *Anthoxanthum odoratum*



anthos	<i>griech.</i> Blüte
xanthos	<i>griech.</i> gelb
odoratus	<i>lat.</i> duftend
Familie	Süßgräser/Poaceae
Futtertyp	Gräser

BESCHREIBUNG

Das Gemeine Ruchgras ist ein kleines, ausdauerndes, locker horstig wachsendes Gras. Es kann bis zu 50 cm hoch werden. Die Blüten sind ährig zusammengezogen und verfärben sich mit dem Fortschreiten der Blütezeit von hellgrün nach braungelb.

VORKOMMEN

Das Gemeine Ruchgras ist ein häufiges Gras von der Ebene bis ins Gebirge und auf fast allen Böden zuhause, besonders gerne auf trockenen bis mäßig feuchten Standorten.

WIRKUNG

Es ist kein besonders ergiebiges Futtergras und wird vom Weidevieh wegen seines bitteren Geschmacks sogar eher gemieden. Durch den hohen Cumarin-gehalt ist es mitverantwortlich für den charakteristischen Geruch des Heus und wird u.a. Kräuterkissen zugefügt.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Fundort

Gewöhnliche Blasen-Lichtnelke / *Silene vulgaris*



Silenos	griechische dickbauchige Naturgeister, die Bezeichnung bezieht sich auf den aufgeblasenen Kelch
vulgaris	<i>lat.</i> gewöhnlich
Familie	Nelkengewächse/Caryophyllaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Blasen-Lichtnelke ist eine mehrjährige krautige Pflanze. Sie erreicht eine Wuchshöhe von 20 - 50 cm. Wie alle Nelkengewächse besitzt sie gegenständige Blätter. Diese sind wie die gesamte Pflanze kahl und bläulich bereift. Der Blütenstand ist ebenfalls typisch für die Pflanzenfamilie zweigabelig. Der verwachsene Kelch ist aufgeblasen und es lassen sich deutliche Nerven erkennen. Die Blütenblätter selbst sind weiß und ragen aus diesem Kelch hervor. Bestäuber sind vornehmlich Nachtfalter und langrüsselige Hummeln, die vor allem durch den in der Nacht verströmten Duft angelockt werden.

VORKOMMEN

Die Blasen-Lichtnelke wächst auf trockenen, wechselfeuchten, nicht sauren und stickstoffarmen Böden in Wiesen von Tieflagen bis ins Hochgebirge. Neben der in Wiesen vorkommenden Form gibt es auch Unterarten, die Kalkschuttfuren oder schwermetallreiche Böden besiedeln.

WIRKUNG

Der Futterwert der Pflanze ist mäßig. Die tiefreichenden Wurzeln wurden früher zu Seifenlauge verkocht.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Gewöhnlicher Glatthafer, Französisches Raygras / *Arrhenaterum elatius*



arrhén griech. männlich
athér, atéros griech. Granne
Familie Süßgräser/Poaceae
Futtertyp Gräser

BESCHREIBUNG

Der Glatthafer ist ein in Horsten wachsendes, ausdauerndes Gras mit tiefreichenden gelblichen Rhizomen. Die Halme werden 50 - 150 cm lang, die Blätter bis zu 1 cm breit und 40 cm lang und kräftig grün.

Die Blüten sitzen üblicherweise in zweiblütigen Ährchen, diese sind in lockeren oder zusammengezogenen Rispen angeordnet. Die Hüllspelzen sind häutig und zugespitzt, die untere Deckspelze (zwittrige Blüte) ist lang und gut sichtbar begrannt, die obere (männliche Blüte) trägt nur eine sehr kurze, oft in den Spelzen verborgene Granne.

VORKOMMEN

Der Gewöhnliche Glatthafer ist die Kennart der Glatthaferwiesen (*Arrhenaterion elatioris*) und in den gemäßigten Zonen Europas und Westasiens weit verbreitet. Ursprünglich stammt er aus dem nördlichen Mittelmeerraum. Er bevorzugt zwei-

schürige bis dreischürige Mähwiesen auf wechselfeuchten bis trockenen Böden in warmen Lagen und verträgt Beschattung nur bedingt.

WIRKUNG

Die wirtschaftliche Bedeutung des gewöhnlichen Glatthafers ist groß, da er als Mähgras zur Heugewinnung gute Erträge liefert. Bei häufigem Schnitt und starker Beweidung verschwindet er allerdings bald. Wegen des Saponingehalts (bitterer Geschmack) wird er als Grünfutter nicht gerne gefressen.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Fundort
												Feuchtwiese

Gewöhnlicher Wiesen-Augentrost / *Euphrasia officinalis ssp. rostkoviana*



euphrasia griech. Frohsinn, Wohlbefinden
officin lat. Arbeitsraum, alter Ausdruck für Apotheke
rostkov die Bezeichnung geht zurück auf den Botaniker Rostkov
Familie Sommerwurzgewächse/Orobanchaceae
Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Augentrost ist ein einjähriger Halbschmarotzer auf verschiedenen Wiesenpflanzen. Er kann mit Hilfe von Saugwurzeln den anderen Pflanzen Mineralien und Nährstoffe entziehen. Die Blätter stehen einander am Stängel paarweise gegenüber. Die zweilippigen Blüten stehen einzeln in den Achseln der Blätter. Auffallend sind die charakteristischen Farbflecken und Strichsaftmale, die Bestäubern den richtigen Weg weisen.

VORKOMMEN

Der Wiesen-Augentrost bevorzugt trockene bis frische und magere Wiesen und Weiden. Intensive Grünlandwirtschaft führt zu seiner Verdrängung. Bei Massenaufreten wird der Weideertrag gemindert. So kamen auch Volksnamen wie „Millidiab“ zustande.

WIRKUNG

Die Pflanzen werden volksmedizinisch bei entzündlichen Augenleiden verwendet, was vor allem auf die Signaturenlehre zurückführbar ist: Die Blüten sollen an ein Auge erinnern. Mittlerweile ist die entzündungshemmende Heilwirkung auch wissenschaftlich belegt.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Fundort
												Trockenwiese

Gewöhnliches Knäuelgras / *Dactylis glomerata*



dactylos	griech. Finger
dactylis	griech. Traubensorte als Hinweis auf die Häufung der Ährchen an den Rispenästen
glomeratus	lat. knäueiförmig
Familie	Süßgräser/Poaceae
Futtertyp	Gräser

BESCHREIBUNG

Das Gewöhnliche Knäuelgras ist eine wintergrüne Horstpflanze. Sie hat bis zu 10 mm breite Blätter, die längsgefaltet sind. Die Blüten sind in kleinen Ähren angeordnet, die dicht knäuelig gedrängt sind. Sehr häufig ist ein weit abstehender unterster Rispenast vorhanden. Die Früchte bleiben mit der gewimperten Hüllspelze und einer Deckspelze verbunden. Dadurch wird zusätzlich zur Verbreitung über den Wind und das Wasser auch die Klettverbreitung möglich.

VORKOMMEN

Das Knäuelgras gedeiht gern auf frischen Böden, die nährstoffreich sind. Insbesondere findet man das Knäuelgras auf stickstoffreichen Böden, das Vorkommen des Knäuelgrases zeigt Lehm Böden an.

WIRKUNG

Das Gewöhnliche Knäuelgras ist ein sehr wertvolles Futtergras, das sich durch Nährstoffreichtum, Ertragsreichtum und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Bei andauernder früher Nutzung sterben die Horste allerdings ab und es entstehen Lücken im Bestand, die in Folge leicht verunkrauten. Auch Beweidung und Tritt wird nur bedingt vertragen.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Gewöhnliche Kuckucksnelke / *Lychnis flos-cuculi*



lychnos	griech. Lampe, Licht
flos	lat. Blüte
cuculus	lat. Kuckuck
Familie	Nelkengewächse/Caryophyllaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Kuckucksnelke ist eine mehrjährige Staude. Sie wird bis ca. 80 cm hoch. Die Blätter sind schmal-eiförmig bis spatelig und gegenständig. Unterhalb der Blätter sind die Stängel meist etwas klebrig. Die rosa-purpurnen Blüten sind in lockeren Rispen angeordnet. Die fünf Kronblätter werden bis zu 25 mm lang und sind in vier etwas unterschiedlich große und schmale Zipfel zerteilt. Die Basis ist bleich und steckt nagelähnlich in einer bis 10 mm langen Röhre aus miteinander verwachsenen Kelchblättern.

Die Bestäubung erfolgt durch Schmetterlinge und langrüsselige Bienen-Verwandte, die in der Lage sind, den Nektar am Grund der Kelchröhre aufzunehmen.

Häufig sind an den Stängeln weiße schaumige Tropfen zu sehen. In diesen als „Kuckucksspeichel“ bezeichneten Schaumhäufchen verbergen sich die

Larven von Schaumzikaden, die geschützt durch den Schaum am Stängel saugen.

VORKOMMEN

Die Gewöhnliche Kuckucksnelke ist eine typische Art auf feuchten bis fast nassen Böden und kommt hauptsächlich in mäbig nährstoffreichen bis nährstoffreichen Feuchtwiesen (Sumpfdotterblumen-Wiesen, Pfeifengras-Wiesen oder feuchten Glatthafer-Wiesen) vor.

WIRKUNG

Der Kuckucksnelke wurden in der Vergangenheit von der Volksheilkunde geringe Wirkungen zugeschrieben, sie wird als Heilpflanze heute aber nur selten eingesetzt.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Nasswiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

Fundort

Große Bibernelle / *Pimpinella major*



Pimpinella die Herkunft der Bezeichnung ist unklar

maior lat. größer

Familie Doldenblütler/Apiaceae

Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Große Bibernelle ist eine sehr vielgestaltige, ausdauernde Pflanze mit kräftigem Wurzelstock. Sie erreicht eine Wuchshöhe von etwa 40 - 100 cm. Die Bibernelle hat einen kahlen, von scharfkantigen Furchen geprägten, hohlen Stängel. Die Blätter sind einfach gefiedert, die einzelnen Teilblättchen gezähnt. Beim Zerreiben verströmen sie einen aromatischen Geruch. Die kleinen Blüten sind in Dolden angeordnet.

VORKOMMEN

Die Große Bibernelle ist eine Fettwiesenpflanze, sie gedeiht auf nährstoffreichen, lehmigen Böden. In den Tallagen sind meist weißblühende Rassen verbreitet, in den höheren Regionen rosafarbene.

WIRKUNG

Der Futterwert der Pflanzen ist gut, sie werden auch gerne vom Weidevieh gefressen. Der Mensch nutzt die Bibernelle seit dem 16. Jahrhundert, unter anderem vorbeugend gegen die damals grassierenden Epidemien.

Heute wird in erster Linie der Wurzelstock verwendet, und zwar als Hustenmittel und zur Mundpflege sowie zur Stärkung der Verdauungsorgane. Auch in Magenbittern wird die Bibernelle zur Aromatisierung beigemischt. Pharmakologisch relevant sind die enthaltenen ätherischen Öle Cumarin und Saponin.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Großer Wiesen-Bocksbart / *Tragopogon orientalis*



tragos griech. Ziegenbock

pogon griech. Bart

Familie Korbblütler/Asteraceae

Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Große Wiesen-Bocksbart ist eine krautige Halbrosettenpflanze mit einer kräftigen Pfahlwurzel. Er erreicht eine Wuchshöhe von bis zu 70 cm. Der hohle Stängel ist oben leicht angeschwollen und wie die schmalen, grasartigen Blätter kahl. Bei Verletzung tritt weißer, klebriger Milchsafte aus. Die zahlreichen gelben Zungenblüten sind in bis zu 7 cm großen Körbchen zusammengefasst, die von acht grünen, spitzen Hüllblättern umgeben sind. Die Staubblätter sind an ihrer Spitze braunviolett gefärbt, wodurch im Köpfchen ein gesprenkelter Eindruck entsteht. Die abgeblühten Zungenblüten ragen noch aus den zusammengefalteten Köpfchen wie ein Ziegenbart hervor und verleihen der Pflanze ihren Namen. Die Blütenköpfe öffnen sich bei Sonnenschein am frühen Morgen und schließen sich am frühen Nachmittag wieder. Die Früchte tragen bis zu 4 cm breite Fallschirmchen und ermöglichen eine effiziente Verbreitung.

VORKOMMEN

Der Wiesen-Bocksbart ist überall in Mitteleuropa auf nährstoffreichen, frischen Wiesen über basischem Untergrund verbreitet. Sommerwarme Plätze werden bevorzugt, staunasse Böden gemieden. Der Futterwert wird eher als gering angegeben.

WIRKUNG

Im Mittelalter wurde die Pflanze wegen des kohlehydratreichen Rhizoms noch als Nahrungsmittel angebaut, dann aber von der verwandten Schwarzwurzel abgelöst.

Alle jungen Pflanzenteile können roh gegessen werden und schmecken süßlich.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Großer Wiesenknopf / *Sanguisorba officinalis*



sanguis	<i>lat.</i> Blut
sorbere	<i>lat.</i> aufsaugen, bezieht sich auf die tiefroten Blütenköpfe
officin	<i>lat.</i> Arbeitsraum, alter Ausdruck für Apotheke
Familie	Rosengewächse/Rosaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Große Wiesenknopf ist eine ausdauernde, krautige Pflanze. Er erreicht eine Wuchshöhe bis etwa 100 cm. Sein aufrechter Stängel ist rund, gerillt und kahl, manchmal ist die Basis behaart. Die am Stängel verteilt angeordneten Laubblätter sind unpaarig gefiedert, die Blattoberseite ist dunkelgrün, die Unterseite blaugrün. Die Form der Teilblättchen ist rund mit gesägtem Rand. Die kleinen tiefroten bis braunen Blütenköpfe sind in kleinen walzenförmigen Köpfchen angeordnet.

VORKOMMEN

Der Große Wiesenknopf wächst gerne auf wechselnd trockenen bis feuchten, neutralen Böden, die nährstoffreich sind – von der Ebene bis in die subalpine Stufe.

WIRKUNG

Er ist eine ausgezeichnete Futterpflanze, die besonders mineralstoffreich ist und vor allem im jungen Zustand gerne gefressen wird.

Unter den Inhaltsstoffen sind verschiedene Gerbstoffe und Saponine von besonderer Bedeutung. Sie wirken entzündungshemmend, antiseptisch und blutstillend.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Feuchtwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Gundermann / *Glechoma herderacea*



glechon	<i>griech.</i> Bezeichnung für die Poley-Minze, die später auf den Gundermann übertragen wurde
hederaceus	<i>lat.</i> efeublättrig
Familie	Lippenblütler/Lamiaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Gundermann ist eine am Boden kriechende, an den Knoten wurzelnde Pflanze. Seine Blüentriebe sind 10 - 30 cm hoch. Er hat kreuzgegenständige, nieren- bis herzförmige Blätter, die am Rand gekerbt sind. In deren Achseln sitzen blasse violette Blüten mit einem dunklen Mal auf der Unterlippe, die sehr zuckerreichen Nektar bilden und somit sehr wertvoll für Blütenbesucher sind.

VORKOMMEN

Der Gundermann bevorzugt unter anderem feuchte, nährstoffreiche Böden auf Wiesen und Äckern und auf kalkhaltigem Untergrund.

WIRKUNG

Der Gundermann ist eine altbekannte Heilpflanze und enthält ätherische Öle und Flavonoide. Die Volksheilkunde verwendet ihn bei Magenverstimmungen, gegen Husten und äußerlich bei schlecht heilenden Wunden.

Nach einem mittelalterlichen Glauben wirkte der Gundermann schützend vor Verhexungen von Kühen, für Pferde ist er allerdings giftig. Der Futterwert wird als gering angegeben.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Feuchtwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Herbst-Zeitlose / *Colchicum autumnale*



kolchis	Landschaft in Griechenland, in der der Mythologie zufolge die Giftmischerin Medea ihr Unwesen trieb
autumnalis	<i>lat.</i> herbstlich
Familie	Herbstzeitlosengewächse/ Colchicaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Herbst-Zeitlose ist ein Knollen-Geophyt mit tief im Boden steckender Knolle. Die Blätter wachsen bis zu 35 cm hoch, die Blüten zählen mit bis zu 25 cm zu den größten in der heimischen Flora. Die sattgrünen und etwas derb-dicklichen Blätter erscheinen im Frühjahr. Sie sind länglich-lanzettlich und ungestielt. Etwas später folgen im Zentrum der Blattrosetten die etwas aufgeblasenen Kapselfrüchte. Die Blüten erscheinen erst ab dem Hochsommer. Die sternförmig spreizenden Blütenblätter sind im unteren Teil zu einer langen, schmalen Blütenröhre verwachsen.

VORKOMMEN

Die Herbst-Zeitlose findet man zahlreich auf frischen, nährstoffreichen und basischen Böden, sowohl in Fettwiesen als auch in Auwäldern.

WIRKUNG

Die Pflanze zählt zu den giftigsten Pflanzen der heimischen Flora, sie enthält das Zellteilungsgift Colchizin. Colchizin wird weder durch Trocknung noch durch Silage ausreichend abgebaut. 1,5 - 2,5 kg frische Blätter und Früchte bzw. getrocknetes Pflanzenmaterial gelten als tödliche Dosis für Rinder. Für Erwachsene gelten 5 g der besonders giftigen Samen als tödliche Menge, für Kinder bereits 1 - 2 g.

Um eine Ausbreitung der Herbst-Zeitlosen in den Wiesen zu verhindern, sollten die Einzelpflanzen Anfang Mai ausgestochen oder herausgezogen werden.

ACHTUNG

Die Herbst-Zeitlose ähnelt dem Bärlauch (*Allium ursinum*). Bärlauch-Blätter unterscheiden sich jedoch durch einen deutlichen Stiel und sind weichlaubig, abgesehen vom markanten Knoblauchgeruch.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Kleiner Klappertopf / *Rhinanthus minor*



rhinos	<i>griech.</i> Rüssel, rüsselartig ausgezogene Oberlippe der Blüte
anthos	<i>griech.</i> Blüte
minor	<i>lat.</i> klein
Familie	Sommerwurzgewächse/Orobanchaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Kleine Klappertopf ist eine einjährige, fakultativ halbpasitäre Pflanze. Er wird bis zu 50 cm hoch. Der Klappertopf dringt mit kleinen Saugfortsätzen zu den wasserleitenden Geweben der Wirtspflanzen vor und entzieht ihnen Mineralien und Nährstoffe. Er kann aber durchaus auch ohne Wirtspflanze auskommen.

Die Blätter sitzen gegenständig am Stängel. In den oberen Regionen sitzen die Blüten einzeln in den Blattachseln gelblich verfärbter Tragblätter und tragen einen weit aufgeblasenen, kahlen Kelch. Die an sich gelben Blüten tragen an der Oberlippe zwei bläuliche Zähne. Nach dem Abblühen trocknen auch die Kelche ein. Das charakteristische Klappern entsteht durch die lockeren Samen in den Fruchtkapseln.

VORKOMMEN

Der Kleine Klappertopf besiedelt mit Vorliebe trockene, kalkarme Magerrasen und Wiesen.

WIRKUNG

Die Pflanzen sind im grünen Zustand schwach giftig, im Heu jedoch unproblematisch.

Der Inhaltsstoff Aucubin besitzt antibiotische Eigenschaften gegen Bakterien (Staphylokokken, Meningokokken und Salmonellen), kann aber in erhöhter Dosis Entzündungen im Magen-Darm-Bereich auslösen. In früheren Zeiten wurde der Klappertopf als Antiparasitikum z. B. gegen Kopfläuse verwendet.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Fundort

Kleines und Großes Wiesen-Labkraut / *Galium album*, *Galium mollugo*



gala griech. Milch
albus lat. weiß
mollis lat. weich
Familie Rötengewächse/Rubiaceae
Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Das Kleine und das Große Labkraut sind einander sehr ähnliche mehrjährige Arten mit tiefreichendem Wurzelsystem. Sie erreichen eine Wuchshöhe von bis zu 100 cm. Beide Arten haben einen vierkantigen Stängel mit in einem Blattquirl stehenden, linealischen Blättern.

Der Hauptunterschied liegt in der Größe der Blüten und der Länge der Blütenstiele. Das Große Wiesen-Labkraut hat Blüten mit 3 - 5 mm Durchmesser auf einem bis 3 mm langen Blütenstiel. Das Kleine Wiesen-Labkraut hingegen hat einen Blütendurchmesser von nur 2 - 3 mm und der Blütenstiel ist länger als 3 mm.

VORKOMMEN

Beide Wiesen-Labkraut-Arten besiedeln Fettwiesen und Halbtrockenrasen und sind auf frischen, basenreichen Lehm- und Tonböden zu finden.

WIRKUNG

Der Futterwert der Pflanzen ist mäßig, frische Austriebe werden als Wildgemüse gegessen. Die Wurzeln des Wiesen-Labkrautes wurden zur Rotfärbung von Wolle und Leinen verwendet.

Wie schon der deutsche Name der Pflanze sagt, enthält sie das Enzym Lab, das auch im Kältermagen vorkommt und zur Käseherstellung verwendet wird.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese

Fundort

Klein-Pfeifengras, Blaues Pfeifengras / *Molinia caerulea*



Molina die Bezeichnung geht zurück auf den chilenischen Missionar und Pflanzenkundler Juan Ignacio Molina
caeruleus lat. blau
Familie Süßgräser/Poaceae
Futtertyp Gräser

BESCHREIBUNG

Das Blaue Pfeifengras ist ein ausdauerndes, recht vielgestaltiges Gras, das lockere Horste bildet. Es erreicht meist 50 - 100 cm Höhe. Die Halme weisen nur an der Basis eng aneinandergesetzte Knoten auf und wirken daher im Gegensatz zu den übrigen Süßgräsern knotenlos. Die typisch grasartigen Blätter werden bis ca. 10 mm breit und weisen anstelle einer Ligula einen Haarkranz auf. Die Ährchen sind ca. 4 - 8 mm lang, durch die auffallende blau-violette Färbung wirkt der gesamte Blütenstand ebenfalls dunkel. Die Ährchen sind zu Rispen mit oft aufrechten und an der Hauptachse anliegenden Ästchen zusammengefasst. Mit einer Hauptblütezeit von Juli bis September (Oktober) ist es eine der am spätesten blühenden heimischen Süßgras-Arten.

VORKOMMEN

Das Blaue Pfeifengras ist eine typische Art auf lichten, wechselfeuchten bis nas-

sen, schwach sauren bis neutralen, aber basenreichen und nährstoffarmen Böden. Neben lichten Wäldern kommt die Art in Niedermoorwiesen und nährstoffarmen Feuchtwiesen oft bestandesbildend vor. Das Blaue Pfeifengras ist Namensgeber für die Gesellschaft der Pfeifengras-Wiesen („Streuwiesen“). Die Mahdverträglichkeit ist eher gering, mehr als zwei Mal mähen pro Jahr wird kaum vertragen. Gelegentlicher Trockenheit begegnet die Pflanze mit bis zu 100 cm tief reichendem Wurzelwerk und mit dem Einrollen der Blätter.

WIRKUNG

Die deutschsprachige Bezeichnung Pfeifengras geht auf die Verwendung der langen, knotenlosen Halme zum Reinigen langer Pfeifen zurück.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Nasswiese

Fundort

Kohl-Kratzdistel / *Cirsium oleraceum*



kirsos	<i>griech.</i> Krampfadern, seit dem Altertum wurden verschiedene Arten gegen Krampfadern genutzt
oleraceus	<i>lat.</i> hohllartig
Familie	Korbblütler/Asteraceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Kohl-Kratzdistel ist eine mehrjährige Staude mit kräftigem Wurzelstock. Sie kann bis 150 cm hoch werden. Im Gegensatz zu den anderen Kratzdistel-Arten hat sie weiche, schwach dornige, hellgrüne Blätter. Diese werden im oberen Abschnitt der Pflanze deutlich kleiner und fiederteilig. Zudem sitzen die Blätter dort mit einem umfassenden Öhrchen am Stängel. Die Blüten sind blassgelb und in Körbchen zusammengefasst, die wiederum zu mehreren von einem blassgelben bis hellgrünen Hochblatt umfasst werden.

VORKOMMEN

Die Kohl-Kratzdistel ist die namensgebende Art der Kohldistelwiesen. Das sind im Allgemeinen nährstoffreiche und feuchte Fettwiesen. Die Kohl-Kratzdistel zeigt Staunässe und Düngung an. Durch Überdüngung kommt es zur Massenentfaltung.

WIRKUNG

Solange die Pflanzen jung sind, geben sie ein wertvolles Futter ab. Ältere Pflanzen werden besonders von Weidetieren gemieden. Trocknen ist aber kaum möglich, da die Blätter zerbröseln.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Nasswiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

Fundort

Löwenzahn / *Taraxacum officinalis* agg.



tharakhchakon	<i>arabisch</i> eine Art wilde Endivie, die wie grüner Salat gegessen wird
officin	<i>lat.</i> Arbeitsraum, alter Ausdruck für Apotheke
Familie	Korbblütler/Asteraceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Löwenzahn ist eine sehr weit verbreitete mehrjährige Pflanze von krautigem Wuchs. Er erreicht eine Wuchshöhe von meist 30 - 40 cm und hat eine lange, fleischige Pfahlwurzel. Die gesamte Pflanze enthält reichlich bitter schmeckenden Milchsaft, der sich an der Luft braun verfärbt. Die Blätter stehen in einer Rosette, die Blüten sind in einem Korb, der auf einem hohlen Schaft steht, zusammengefasst. Die charakteristischen Früchte mit ihren Flugschirmen werden sehr effektiv über den Wind verbreitet.

Die Bestimmung von Taraxacum-Arten ist sehr problematisch. Bei Taraxacum officinale handelt es sich um eine Artengruppe, deren Erforschung noch nicht abgeschlossen ist: Aufgrund großer Formenvielfalt unterscheiden Spezialisten etliche Klein- und Unterarten.

VORKOMMEN

Jeder kennt den Löwenzahn von Wiesen

und Wegrändern von der Ebene bis ins Gebirge. Bevorzugt werden durchwegs nährstoffreiche Standorte, was bei Überdüngung zu einer Massenentfaltung in den Wiesen führt.

Wegen der frühen Blütezeit ist der Löwenzahn eine sehr wichtige Bienenweide.

WIRKUNG

Aus den Blüten kann ein gut schmeckender Sirup gewonnen werden, sehr beliebt ist der Salat aus den jungen gestochenen Blattrosetten. In der Nachkriegszeit wurden die gerösteten Wurzeln als Kaffee-Ersatz verwendet.

Die in allen Teilen enthaltenen Gerbstoffe wirken verdauungsfördernd und harntreibend, so wird der Löwenzahn auch medizinisch bei Gallen- und Leberleiden angewandt.

Für Tiere liefert er ein rohfaserarmes und eiweißreiches Futter.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Mädesüß / *Filipendula ulmaria*



filum	<i>lat.</i> Faden
pendulus	<i>lat.</i> hängend, bei einzelnen Arten der Gattung hängen Wurzelknöllchen an Feinwurzeln
ulmaria	<i>lat.</i> die einzelnen Teilblättchen ähneln Ulmenblättern
Familie	Rosengewächse/Rosaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Mädesüß-Arten sind ausdauernde, krautige Staudenpflanzen mit waagrecht verlaufendem Rhizom. Sie erreichen eine Höhe von etwa 100 cm. Der kräftige Stängel ist rot überlaufen mit wechselständigen Blättern. Die Blätter sind unterbrochen gefiedert: Es wechseln einander jeweils größere und kleinere Teilblättchen entlang der Blattspindel ab. Die Teilblättchen sind am Rand gesägt und auf der Unterseite deutlich silbrig behaart. Die besonders am Abend intensiv duftenden kleinen Blüten stehen gedrängt am Ende des Stängels in einem trugdoldigen Blütenstand.

Der deutsche Name „Mädesüß“ stammt von Mahd, oder „Mede“ und ist ein altertümlicher Begriff für Grasland und den süßen Duft der Blüten, die während der Heumahd blühen.

VORKOMMEN

Das Mädesüß wächst vornehmlich in feuchten und moorigen Wiesen und Gräben, die nährstoffreich sind.

WIRKUNG

Wegen des intensiven vanilleartigen Geruchs wird das Mädesüß seit langem zum Aromatisieren verwendet, unter anderem für Getränke, in der Imkerei und im Haushalt.

Hauptwirkstoff in der Pflanze ist eine Vorstufe der Salicylsäure (Salicylaldehyd), deren Umwandlung in der Leber erfolgt. Dieser Stoff hat entzündungshemmende und fiebersenkende Eigenschaften und wird in der Volksmedizin bei Tier und Mensch in diesem Sinn verwendet.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Nasswiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

Fundort

Rauer Löwenzahn / *Leontodon hispidus* ssp. *hispidus*



leon	<i>griech.</i> Löwe
odon	<i>griech.</i> Zahn
hispidus	<i>lat.</i> rau
Familie	Korbblütler/Asteraceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Pflanze ist ausdauernd, mit schiefer bis waagrechtem Wurzelstock. Die Laubblätter sind in grundständigen Rosetten vereinigt und mit sehr unterschiedlich gestaltetem Blattrand. Es kommen sowohl nur entfernt gezähnte wie unterschiedlich tief eingeschnittene bis hin zu fiederteilige Blätter vor. Der unverzweigte, schaftartige, bis 50 cm hohe, feste Stängel trägt bis zu zwei schuppenförmige Hochblätter (im Unterschied zu Löwenzahn/Taraxacum mit leicht zusammenrückbarem und völlig blattlosem Stängel) und am Ende einen Blütenkorb mit gelben Zungenblüten.

VORKOMMEN

Der Raue Löwenzahn kommt in unterschiedlichen Wiesen- und Weidetypen und auch in lichten Wäldern vor und zählt zu den häufigsten Grünlandkräutern vom Tal bis weit über die Waldgrenze. Dort ist er eine der Charakterarten der Goldhafer-Bergfettwiesen (Polygono-Trisetion).

WIRKUNG

Die weißen Milchsaft führende Pflanze zählt zu den guten Futterkräutern.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Rot-Klee / *Trifolium pratense*



tri	<i>lat.</i> drei
folium	<i>lat.</i> Blatt
pratense	<i>lat.</i> Wiese
Familie	Schmetterlingsblütler/Fabaceae
Futtertyp	Leguminosen

BESCHREIBUNG

Der Rot-Klee besitzt eine kräftige Pfahlwurzel und einen kantigen, oft rot überlaufenen Stängel mit wechselständigen, dreiteiligen Blättern. Die einzelnen Teilblättchen sind eiförmig mit je einem pfeilförmigen weißen Fleck auf der Oberseite. Die mehr oder weniger purpurroten Schmetterlingsblüten sind in Köpfchen zusammengefasst. Bestäubt werden sie von Nektar und Pollen sammelnden Bienen, Hummeln und Schmetterlingen. Die Blätter führen Schlafbewegungen durch, sie falten sich nachts zusammen.

VORKOMMEN

Bevorzugt werden frische, lehmreiche, tiefgründige Böden in Wiesen und Feldern von der Ebene bis ins Gebirge.

WIRKUNG

Der Rot-Klee ist eine sehr bedeutende Futterpflanze, die auch aufgrund der Symbiose mit Knöllchenbakterien sehr

anpassungsfähig ist und rasch nachwächst. Der Futterwert von Kleeheu ist sehr hoch, wie von den meisten Schmetterlingsblütlern.

Zu hohe Kleeanteile im Grünfutter können aber verschiedene Erkrankungen beim Nutztvieh auslösen. Ein zu hoher Anteil in den Wiesen führt beim Tier zu einer Überversorgung mit Rohproteinen, wodurch Stoffwechsel- und Fruchtbarkeitsprobleme entstehen können.

Unter den Inhaltsstoffen sind besonders die Isoflavonoide hervorzuheben, die als Phytoöstrogene positive Effekte auf Wechselbeschwerden beim Menschen haben.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Scharfer Hahnenfuß / *Ranunculus acris*



rana	<i>lat.</i> Frosch, ranunculus ist die Verkleinerung zu rana
acer	<i>lat.</i> scharf
Familie	Hahnenfußgewächse/Ranunculaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Scharfe Hahnenfuß wächst als ausdauernde, krautige Pflanze und besitzt ein Rhizom zur Überdauerung. Er erreicht Wuchshöhen von 30 - 110 cm. Sein Stängel ist reich verzweigt. Die Blätter sind drei- bis fünfteilig mit tief geteilten Abschnitten. Die Blüten locken mit leuchtend gelben kronblattartigen Nektarblättern ihre Bestäuber an. Sie sind von fünf behaarten Kelchblättern umgeben, die von der offenen Blüte waagrecht abstehen.

VORKOMMEN

Der Scharfe Hahnenfuß ist auf der gesamten Nordhalbkugel in allen Höhenlagen verbreitet. Er bevorzugt Wiesen mit stickstoffhaltigen, feuchten Lehmböden.

WIRKUNG

So wie viele Hahnenfußgewächse enthält auch der Scharfe Hahnenfuß Giftstoffe wie Ranunculin und Protoanemonin, die für Mensch und Tier giftig sind.

Sofern genügend anderes Grünfutter zur Verfügung steht, meiden Weidetiere diese Pflanzen wegen ihres brennenden Geschmacks.

Beim Trocknen werden diese Stoffe in das ungiftige Anemonin überführt, sodass das Heu völlig unproblematisch ist. In der Silage hingegen bleiben die Giftstoffe zwei Monate lang erhalten. Intensivnutzung mit Überdüngung führt zu Massenbeständen des Scharfen Hahnenfußes in den Wiesen.

Beim Menschen kann durch Berührung mit dem frisch geschnittenen Kraut die sogenannte Wiesendermatitis ausgelöst werden, eine lokale Reizwirkung des Pflanzensafts.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Schlangen-Knöterich / *Persicaria bistorta*



Persica	<i>lat.</i> Pfirsich, Bezeichnung aufgrund der im Vergleich ähnlichen Blattform
bis	<i>lat.</i> zweimal
tortus	<i>lat.</i> gewunden, nach dem schlangenförmig gedrehten Rhizom
Familie	Knöterichgewächse/Polygonaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Schlangen-Knöterich ist eine mehrjährige krautige Pflanze. Er erreicht Wuchshöhen von bis zu 100 cm. Die unverzweigten Stängel entspringen einem kräftigen, (schlangenartig) gewundenen Wurzelstock. Die Grundblätter sind bis 20 cm lang und lang gestielt. Die Basis der länglich-eiförmigen Grundblätter ist abgestutzt und läuft dann als etwas welliger Flügelsaum den Blattstiel entlang. Die Stängelblätter werden nach oben zunehmend kleiner und weisen einen herzförmigen Blattgrund auf. Die 4 - 5 mm langen, meist rosa Blüten sind zu dichten, endständigen Scheinähren zusammengefasst. Die Früchte sind kleine, 4 - 5 mm lange, stark dreikantige Nüsschen, die von der Blütenhülle umschlossen bleiben.

VORKOMMEN

Der Schlangen-Knöterich zählt zu den typischen Arten feuchter, nährstoffreicher (Fett-)Wiesen von den tiefsten Lagen bis in den Bereich der Waldgrenze.

Besonders in basen- und nährstoffreichen Nasswiesen kommt der Schlangen-Knöterich zur Massenentfaltung.

WIRKUNG

Er gilt einerseits als gute Futterpflanze, andererseits werden die nektarreichen Blüten reichlich von Bienen und anderen Insekten besucht.

Junge Blätter und Stängel können als spinatähnliches Wildgemüse verwendet werden.


Der Wurzelstock hat vor allem in der Volksmedizin Verwendung gefunden, z. B. als Mittel gegen Schlangenbisse. Grund dafür dürfte wohl der schlangenartig gewundene Wurzelstock sein (Signaturenlehre). Heute findet der Wurzelstock noch gelegentlich Anwendung bei Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Feuchtwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Skabiosen-Flockenblume / *Centaurea scabiosa*



Centaurea	die Bezeichnung geht auf den Zentauren Chiron zurück, der mit der Pflanze die Verletzung des Helden Achilles geheilt haben soll
Scabiosa	der Botaniker Linné führte die Bezeichnung Scabiosa für Pflanzen mit kopfigen Blütenständen ein
Familie	Korbblütler/Asteraceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Skabiosen-Flockenblume ist eine mehrjährige Pflanze mit einer kräftigen Pfahlwurzel. Sie kann Wuchshöhen bis 120 cm erreichen. Der Stängel ist kantig und verzweigt, mit rauen Fiederblättern besetzt. Die purpurfarbenen Blüten stehen zusammen in einem bis zu 4 cm breiten Köpfchen. Randliche Blüten sind häufig deutlich größer als die zentral stehenden. Die Hüllblätter tragen an ihrem Rand schwärzliche fransige Anhängsel, die in dieser Gruppe mit mehreren Unterarten ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal darstellen.

VORKOMMEN

Die Skabiosen-Flockenblumen sind kalkliebend. Alle Formen, ob im Tiefland oder in höheren Lagen, bevorzugen trockene Standorte.

WIRKUNG


Der Futterwert für Nutztiere ist mäßig, sie ist aber eine unverzichtbare Futterpflanze für verschiedenste Schmetterlingsarten und deren Raupen. Ihre Blüten werden ausschließlich von Insekten bestäubt und sind auch bedeutend als Bienenweide.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Fundort

Spitz-Wegerich / *Plantago lanceolata*



planus	<i>lat.</i> flach
lanceolatus	<i>lat.</i> lanzenförmig
Familie	Wegerichgewächse/Plantaginaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Spitz-Wegerich ist eine mehrjährige krautige Pflanze. Er erreicht eine Wuchshöhe von 5 - 50 cm. Die spitzen, schmalen, lanzettlichen, blattstiellosen Laubblätter stehen in einer Rosette. Die kleinen, unscheinbaren Blüten sind in einer Ähre angeordnet, die auf einem stielrunden, blattlosen Schaft steht. Die Blüten sind vorweiblich, das heißt, die männlichen Blütenorgane erscheinen erst nach dem Abblühen der weiblichen. Die Bestäubung übernimmt der Wind, die Blütenpollen können Heuschnupfen auslösen.

VORKOMMEN

Der Spitz-Wegerich ist überall auf frischen bis mäßig trockenen Mager- bis Fettwiesen anzutreffen und ist auch eine gern gesehene und wertvolle Futterpflanze.

WIRKUNG

Er ist schon seit alter Zeit eine vorzügliche und eine der bekanntesten Heilpflanzen. Der Pflanzensaft ist antibiotisch wirksam (Aucubin) und hat daher auch eine gute Haltbarkeit. Er hat sich als schleimlösendes Hustenmittel bewährt. Frisch gepresste Blätter auf Insektenstichen lindern Juckreiz und Schwellungen und sind ein rasch wirkendes Notfallmittel.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Stumpfblatt-Ampfer / *Rumex obtusifolius*



rumex	<i>lat.</i> spitzes Wurfgeschöß, die Bezeichnung bezieht sich auf die spießförmigen Blätter einiger Arten
obtusifolius	<i>lat.</i> stumpfblättrig
Familie	Knöterichgewächse/Polygonaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Stumpfblatt-Ampfer ist eine der größten und auffälligsten Stauden auf Wiesen und Weiden. Er erreicht eine durchschnittliche Wuchshöhe von 60 - 120 cm. Die dünnen, weichlaubigen Grundblätter sind bis 40 cm lang und 20 cm breit und haben einen eiförmig-elliptischen Umriss mit herzförmiger Basis. An der Spitze sind sie stumpf bis spitzlich. Die kleinen und unscheinbar grün gefärbten Blüten sind zu großen, steif-aufrechten und reich verzweigten Blütenständen zusammengefasst. Zur Fruchtzeit nehmen die Blüten eine bräunliche Farbe an. Die inneren Blütenhüllblätter („Valven“) schließen zur Fruchtzeit die kleinen Nussfrüchtchen ein und spielen eine Rolle bei der Fruchtverbreitung, indem sie als Flug- und Schwimmhilfe dienen.

VORKOMMEN

Der Stumpfblatt-Ampfer besiedelt frische, nährstoffreiche Standorte wie Wegränder, Äcker, überdüngte Wiesen und Weiden. Er ist ein Stickstoff- und Phosphat- und somit ein Düngezeiger und eine typische Art überdüngter Fettwiesen (Güllewiesen). Gleichzeitig deutet die gut schnittverträgliche Art auch auf Bodenverdichtung hin.

WIRKUNG

Die üppige Pflanze beansprucht viel Raum und verdrängt bei Massenvorkommen andere Arten. Der Futterwert ist allerdings gering.

Ampfer-Arten sind windblütig und zählen zu den Pollenallergie auslösenden Pflanzen.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Sumpf-Dotterblume / *Caltha palustris*



Calthula *lat.* Frauenkleid in gelber Farbe
Palus *lat.* Sumpf
Familie Hahnenfußgewächse/Ranunculaceae
Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Sumpf-Dotterblume ist eine mehrjährige Halbrosenpflanze. Sie wird je nach Standort 15 - 60 cm groß. Die Sumpf-Dotterblume hat einen röhrigen, hohlen Stängel. Die goldgelbe Farbe der Blütenhüllblätter stammt von Karotinoiden, sie wurden auch zum Färben von Butter verwendet. Für die Blütenbesucher steht reichlich Nektar zur Verfügung, der am Grund der Fruchtblätter abgesondert wird. Anders als andere Pflanzen hält die Sumpf-Dotterblume ihre Blüten bei Regen geöffnet. Sie füllen sich mit Wasser und da Staubgefäße und Narben der Fruchtblätter auf gleicher Höhe stehen, können sie sich auf diese Weise selbst befruchten. Die Samen aus den Balgfrüchten enthalten luftgefülltes Gewebe und sind schwimmfähig und an das Leben im feuchten Milieu angepasst.

VORKOMMEN

Die Sumpf-Dotterblume ist eine charakteristische Art der nährstoffreichen Feucht- und Sumpfwiesen und in diesen durch Entwässerungsmaßnahmen stark rückläufig.

WIRKUNG

Die Sumpf-Dotterblume enthält Protoanemonin und ist im frischen Zustand schwach giftig. Sie wird daher vom Weidevieh gemieden, solange genügend Futterpflanzen vorhanden sind. Das Protoanemonin wird beim Trocknen abgebaut und ist somit im Heu nicht mehr relevant.

Die Knospen wurden früher als Kapernersatz gekocht und in Essig eingelegt. Aufgrund der Inhaltsstoffe sollte man jedoch auf diese Verwendung verzichten.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Nasswiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

Fundort

Vogel-Wicke / *Vicia cracca*



vincire *lat.* winden
cracca *lat.* für jede Art von Hülsenfrüchtlern
Familie Schmetterlingsblütler/Fabaceae
Futtertyp Leguminosen

BESCHREIBUNG

Die Vogel-Wicke ist eine kletternde Staude mit tiefreichenden Wurzeln. Sie wird 30 - 120 cm groß. Am vierkantigen Stängel sitzen Labblätter mit 6 - 15 Fiederpaaren und einer endständigen Wickelranke. An den Wurzeln leben in Wurzelknöllchen stickstoffbindende, symbiotische Bakterien. Die lilafarbenen Schmetterlingsblüten stehen zahlreich in einseitigen Trauben, das heißt auf einer Seite gewendeten Trauben.

VORKOMMEN

Die Vogel-Wicke besiedelt vornehmlich Wiesen und Äcker auf frischen Lehm- und Tonböden. Sie reagiert empfindlich auf Dauerbeweidung und häufigen Schnitt.

Die Ausbreitung der Vogel-Wicke wird durch den Menschen gefördert, sie ist schon seit der Steinzeit als typischer Kulturbegleiter bekannt.

WIRKUNG

Die Vogel-Wicke zählt zu den Eiweißlieferanten wie alle Leguminosen. Da sie für den Menschen nicht genießbar ist, gab man ihr den Namen Vogel-Wicke: den Vögeln überlassene Wicke.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Wiesen-Bärenklau / *Heracleum sphondylium*



- Herakles** Held der griechischen Mythologie, der angeblich die Heilwirkung entdeckt hat
- sphondylos** griech. Wirbel, aufgeblasener Stängelknoten im Vergleich mit einem Rückgrat
- Familie** Doldenblütler/Apiaceae
- Futtertyp** Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Wiesen-Bärenklau ist eine ausdauernde Halbrosettenpflanze. Er kann bis zu 1,5 m hoch werden und ist tief in der Erde verwurzelt. Charakteristisches Merkmal ist der stark verbreiterte Blattgrund (Ochrea), der die zarten, noch im Wachstum befindlichen Pflanzenteile umhüllt und schützt. Die Blüten sind in schirmförmigen Dolden angeordnet. Die am Rand sitzenden Blüten sind vergrößert (strahlend) und erhöhen so die Attraktivität für bestäubende Insekten. Die Einzelblüten sondern an speziellen Organen reichlich Nektar ab, daher sind sie auch immer von verschiedensten Insekten gut besucht.

VORKOMMEN

Der Wiesen-Bärenklau wächst gern in frischen, nährstoffreichen Fettwiesen und nimmt bei Überdüngung stark zu, sodass andere Arten verdrängt werden und es zu Reinkulturen kommt.

WIRKUNG

Die jungen Blätter sind gutes Viehfutter und können auch vom Menschen gekocht als Gemüse gegessen werden. Bereits die alten Griechen setzten die Pflanzen als Wurmmittel und gegen Durchfall ein.

Die Pflanzen enthalten lichtempfindlich machende Furanocumarine. Die Berührung kann bei empfindlichen Menschen Hautrötungen und Entzündungen (Wiesendermatitis) auslösen. Die Symptomatik ist allerdings um vieles schwächer als bei Kontakten mit dem nicht einheimischen Riesen-Bärenklau.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese

Fundort

Wiesen-Esparsette, Futter-Esparsette / *Onobrychis viciifolia*



- onos** griech. Esel
- brychein** griech. verschlingen
- viciifolia** Blätter, einer Wicke ähnlich
- Familie** Schmetterlingsblütler/Fabaceae
- Futtertyp** Leguminosen

BESCHREIBUNG

Die Futter-Esparsette ist eine mehrjährige ausdauernde Pflanze. Sie wurzelt bis zu 4 m tief und kann dadurch auch an sehr trockenen Standorten überleben. Die Blätter sind gefiedert mit zahlreichen Fiederblättchen. Die rosafarbenen Blüten mit der purpurnen Aderung sind in langgestielten Trauben angeordnet. Die aus Fahne, Flügel und Schiffchen zusammengesetzte Schmetterlingsblüte ist an ihre Besucher optimal angepasst. Beim Aufsitzen wird der Pollen dem Insekt, das vom reichlichen Nektar angelockt wird, auf dem Bauch aufgebracht. Die Futter-Esparsette ist eine gute Bienenweide.

VORKOMMEN

Die Futter-Esparsette kommt mit trockenen Böden genauso zurecht wie mit Rohböden (z. B. an Straßenböschungen). Bei der Besiedelung hilft ihr ihre Symbiose mit stickstoffbindenden Bakterien in den Wurzelknöllchen. Sie ist eine sehr eiweißreiche Trockenfutterpflanze und wird als

solche schon seit dem 16. Jahrhundert kultiviert. Sie stammt ursprünglich aus Südosteuropa, ist mittlerweile aber überall verwildert.

WIRKUNG

Die Pflanzen enthalten sehr viele Tannine (Gerbstoffe), die wurmtreibend und antiblähend wirken. Aus diesem Grund wird die Futter-Esparsette auch Gesundheitsheu genannt.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese

Fundort

Wiesen-Fuchsschwanzgras / *Alopecurus pratensis*



alopex griech. Fuchs
oura griech. Schwanz
pratium lat. Wiese
Familie Süßgräser/Poaceae
Futtertyp Gräser

BESCHREIBUNG

Das ausdauernde Wiesen-Fuchsschwanzgras ist ein in lockeren oder dichten Horsten wachsendes Gras. Es treibt Ausläufer bis 10 cm Länge und aufrechte Halme bis 100 cm Höhe. Die linealischen Blätter werden 4 - 10 mm breit. Die kleinen 4 - 6 mm langen Ährchen tragen eine fast ebenso lange Granne und sind am Ende der Halme zu kompakten, 3 - 10 cm langen Ährenrispen zusammengefasst. Anhand der Färbung der Ährenrispe (grün oder schwärzlich) lassen sich zwei Formen unterscheiden.

Ebenfalls ein Ährenrispengras ist das vordergründig ähnliche Wiesen-Lieschgras, das ähnliche Standorte besiedelt. Es lässt sich leicht anhand der fehlenden Granne unterscheiden.

VORKOMMEN

Gut wasserversorgte und nährstoffreiche sowie staunasse und sauerstoffarme Böden werden vom Wiesen-Fuchsschwanzgras bevorzugt besiedelt. Dementsprechend handelt es sich um eine typische Art nasser bis frischer Fettwiesen von den Tallagen bis in die Bergstufe, die zudem oft kultiviert wird.

WIRKUNG

Die Art gilt als gute Futterpflanze, die auch mehrmaligen Schnitt verträgt. Beweidung verträgt das Wiesen-Fuchsschwanzgras jedoch nur bedingt.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Feuchtwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Wiesen-Goldhafer / *Trisetum flavescens*



tres lat. drei
seta lat. Borste
flavescens lat. goldgelb
Familie Süßgräser/Poaceae
Futtertyp Gräser

BESCHREIBUNG

Der Wiesen-Goldhafer ist ein ausdauerndes, lockere Horste bildendes Gras. Die aufrechten bis aufsteigenden gelbgrünen Halme erreichen Wuchshöhen von meist 20 - 80 cm. Die Blüten sind in reichblütigen, zarten und lockeren Rispen angeordnet, die gelbgrün bis gelblich erscheinen und vor und nach der Blüte zusammengezogen sind. Bis zur Fruchtreife sind die Rispen goldig verfärbt. An der Deckspelze der Ährchen sitzt jeweils eine Granne, die gespalten ist, sodass insgesamt drei Borsten abgehen. Der Wiesen-Goldhafer ist ein sehr wertvolles Mähgras, das einen guten zweiten Schnitt liefert.

VORKOMMEN

Der Wiesen-Goldhafer hat seinen natürlichen Verbreitungsschwerpunkt in den Wiesen des Mittelgebirges und der Bergregionen (Goldhaferwiesen). Aufgrund seines hohen Futterwertes wird er aber überall angesät. Er bevorzugt feuchte, kalk- und nährstoffreiche Böden, die gut gedüngt sind.

WIRKUNG

Goldhafer kann bei zu hohen Ertragsanteilen und frühem Schnitt Kalkablagerungen in Organen, Gelenken und Blutgefäßen verursachen. Bei der Heunutzung aus gut durchmischten Wiesenbeständen kann er seinen Nährstoffreichtum jedoch voll entfalten.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Wiesen-Hornklee / *Lotus corniculatus*



lotos	<i>griech.</i> Bezeichnung verschiedener kleeartiger Pflanzen
corniculatus	<i>lat.</i> gehört, bezieht sich auf die Form des Schiffchens in der Blüte
Familie	Schmetterlingsblütler/Fabaceae
Futtertyp	Leguminosen

BESCHREIBUNG

Der Wiesen-Hornklee ist eine mehrjährige krautige Pflanze. Die blaugrünen Blätter sind dreiteilig mit Nebenblättern an ihrer Ansatzstelle, die genauso wie die Teilblättchen gestaltet sind. So entsteht der Eindruck eines fünfteiligen Blattes. Die gelben Blüten sind in Dolden angeordnet und an ihrer Außenseite oft rot überlaufen. Besonders am Wiesen-Hornklee ist der spezielle Bestäubungsmechanismus: Der Pollen wird durch eine Art Kolben auf den Bauch des Blütenbesuchers gedrückt.

Die Hülsenfrüchte werden bei der Reife schwarz und platzen entlang einer Bauch- und Rückennaht auf, um ihre Samen zu verstreuen.

VORKOMMEN

Der Wiesen-Hornklee ist durch sein weitreichendes Wurzelsystem gut an Trockenheit angepasst, besiedelt aber auch feuchte Wiesen und Weiderasen. Er

besitzt Wurzelknöllchen mit symbiotischen Bakterien, die ihm ermöglichen, zusätzlich Stickstoff aus der Luft für sich zu nutzen. Aus diesem Grund ist er als gute Futterpflanze auch häufig angesät.

WIRKUNG

Der Nektar der Blüten weist einen bis zu 40-prozentigen Zuckergehalt auf und ist daher besonders für Bienen attraktiv.

Der hohe Tanningehalt in der Pflanze kann Blähungen bei Nutztieren reduzieren.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Wiesen-Kerbel / *Anthriscus sylvestris*



anthriscos	<i>griech.</i> eine zu Kränzen geflochtene Blume
sylvestris	<i>lat.</i> im Wald lebend oder wild wachsend
Familie	Doldenblütler/Apiaceae
Futtertyp	Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Wiesen-Kerbel ist eine mehrjährige krautige Pflanze. Er wird 60 - 150 cm groß. Der Wiesen-Kerbel hat eine kräftige Wurzelrübe und einen hohlen Stängel mit Furchen. Die Blätter sind fein und mehrfach gefiedert und im Umriss dreieckig. Die kleinen Blüten sind zu Dolden zusammengefasst und reichlich nektarführend. Aus diesem Grund sind die Blütenstände immer von Insekten besucht.

VORKOMMEN

Der Wiesen-Kerbel tritt sehr häufig in Fettwiesen auf, vor allem auf frischen, nährstoffreichen bis überdüngten Böden.

WIRKUNG

Er ergibt nur in jungem Zustand eine annähernd brauchbare Futterpflanze. Ausgereifte Pflanzen sind derb und schmecken zudem bitter. Sie werden daher nicht gerne gefressen.

Mit den jungen Blättern kann Wolle gelb gefärbt werden, sie werden auch als Wildgemüse gegessen.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Wiesen-Lieschgras / *Phleum pratense*



phleos griech. Rohr, Schilf
prater lat. Wiese, pratense deutet auf den Standort Wiese hin
Familie Süßgräser/Poaceae
Futtertyp Gräser

BESCHREIBUNG

Das Wiesen-Lieschgras ist ein ausdauerndes, lockere Horste bildendes Gras. Die Wuchshöhe der hohlen Halme beträgt 30 - 100 cm. Die Halme können an den untersten Knoten, wenn sie Bodenkontakt haben, wurzeln. Die Blätter sind blaugrün und rau. Die Blüten in den Ährchen sind in sehr dichten, walzenförmigen Ährenrispen angeordnet.

VORKOMMEN

Das Wiesen-Lieschgras ist von den Tieflagen bis ins Gebirge weit verbreitet und wird wegen seines hohen Futterwertes und seiner guten Mahdverträglichkeit auch angebaut. Es bevorzugt nährstoffreiche, schwere Böden und tritt auch verstärkt und massenhaft in den „Güllewiesen“ auf.

WIRKUNG

Die Pollen dieses Grases sind unter anderem für Gräserpollenallergien verantwortlich und werden auch in der Therapie verwendet.

So wie auch andere Gräser können die Pflanzen mit dem Mutterkornpilz infiziert sein. Dieser produziert giftige Alkaloide, die zu Halluzinationen und massiven Durchblutungsstörungen führen. Im Futtermittelanbau sind daher in den Verordnungen Grenzwerte vorgeschrieben.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Wiesen-Pippau / *Crepis biennis*



crepis griech. Schuh, die Bezeichnung geht auf Theophrast, einen griechischen Naturforscher der Antike, zurück, die Bedeutung ist nicht geklärt
biennis lat. zweijährig
Familie Korbblütler/Asteraceae
Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Wiesen-Pippau ist eine zweijährige Pflanze. Er wird bis zu 120 cm groß. Der Stängel ist im oberen Abschnitt stark verzweigt. Die Blätter am Grund sind deutlich gestielt, die Stängelblätter sitzen ohne Stiel auf. Alle Blätter besitzen mehr oder weniger tief geteilte Sägezähne. Es sind zahlreiche Blütenkörbe vorhanden, die mehrere gelbe Zungenblüten enthalten und von schwärzlichen Hüllblättern umfasst werden. Die gesamte Pflanze enthält reichlich Milchsaft.

VORKOMMEN

Der Wiesen-Pippau ist eine sehr häufige Pflanze, die überall verbreitet ist. Besonders anzutreffen ist sie in nährstoffreichen, nicht zu intensiv genutzten Mähwiesen mit frischen Böden, die nicht stickstoffüberdüngt sind. Wenn die Wiesen beweidet werden, verschwindet der Pippau sehr rasch.

WIRKUNG

Die groben Stängel liefern ein ebenso grobes Heu.

Vom Menschen werden die jungen Blätter als Wildsalat geschätzt.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Wiesen-Platterbse / *Lathyrus pratensis*



- lathyros** griech. Platterbse, bescheidene Nahrung armer Leute
- pratium** lat. Wiese
- Familie** Schmetterlingsblütler/Fabaceae
- Futtertyp** Leguminosen

BESCHREIBUNG

Die Wiesen-Platterbse ist eine mehrjährige ausläuferbildende Kletterpflanze. Sie erreicht Wuchshöhen von 30 - 100 cm. Wie die meisten Schmetterlingsblütler hat sie Wurzelknöllchen mit stickstoffbindenden, symbiotischen Bakterien. Die Blätter sind Fiederblätter mit einem Teilblattpaar und einer Ranke. Die gelben Blüten sind in Trauben angeordnet und werden hauptsächlich von Hummeln bestäubt. Die Früchte sind abgeflachte Hülsen, die sich schwarz verfärben.

VORKOMMEN

Die Wiesen-Platterbse bevorzugt nährstoffreiche, frische Wiesen mit lehmigem Boden.

WIRKUNG

Die Pflanzen sind eiweißreich, werden aber nicht gerne gefressen, da sie Bitterstoffe enthalten. Bei intensiver Nutzung, also häufigem Schnitt oder Dauerbeweidung, verschwinden sie aus den Nutzflächen.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Frischwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Wiesen-Salbei / *Salvia pratensis*



- salvare** lat. heilen
- pratier** lat. Wiese, pratensis deutet auf den Standort Wiese hin
- Familie** Lippenblütler/Lamiaceae
- Futtertyp** Kräuter

BESCHREIBUNG

Der Wiesen-Salbei ist eine krautige Halbrosettenpflanze. Er wird bis zu 60 cm groß und wurzelt mit einer bis 100 cm langen Pfahlwurzel. Der vierkantige Stängel trägt ebenfalls paarig gegenüberstehende, runzelige Blätter. Die Blüten sind in Scheinquirlen angeordnet, die stark zweilippig und meist blau sind, aber auch rosa oder weiß gefärbt sein können. Im unteren Bereich sind sie röhrenförmig verwachsen. Der freie obere Teil gliedert sich in eine Unterlippe, die als Landeplatz für blütenbesuchende Insekten dient, und eine Oberlippe, unter der die Staubgefäße verborgen liegen.

Nur Hummeln sind in der Lage, in die Blüte einzudringen: Dabei stößt ihr Kopf gegen einen Hebel, der einen Mechanismus auslöst und die Staubbeutel auf den Hinterleib des Insekts schlägt. Die Hummel darf sich nun mit ihrem langen Saugrüssel vom Nektar am Blütengrund

bedienen. In der nächsten Blüte wird sie den Pollen von ihrem Rücken am Stempel abstreifen und für die Befruchtung sorgen.

VORKOMMEN

Der Wiesen-Salbei bevorzugt warme, trockene Standorte mit mäßigem Nährstoffgehalt über kalkhaltigem Untergrund. Zum Blühen benötigt er viel Licht, bei zu starker Beschattung bleiben die Rosetten steril.

WIRKUNG

Die gesamte Pflanze ist reich an ätherischen Ölen, die entzündungshemmend wirken.

Diese Inhaltsstoffe wirken sich auch positiv auf die Gesundheit von Nutztieren aus.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Fundort

Wiesen-Schwingel / *Festuca pratensis*



festuca *lat.* Grashalm
pratensis *lat.* Wiese
Familie Süßgräser/Poaceae
Futtertyp Gräser

BESCHREIBUNG

Der Wiesen-Schwingel ist ein in lockeren Horsten wachsendes Obergras. Er wird bis zu 120 cm hoch. Die Blattscheiden sind kahl, bis 7 mm breit und hängen schlaff nach unten. An ihrem Grund umfassen sie den Stängel mit einem Öhrchen.

Die reichblütige Rispe steht aufrecht oder ist leicht überhängend. Die einzelnen Ährchen tragen 5 - 8 Blüten und sind viel länger als die Hüllspelzen.

VORKOMMEN

Der Wiesen-Schwingel ist ein sehr häufiges Gras und eine charakteristische Art der europäischen Wirtschaftswiesen (Molinio-Arrhenatheretea). Die bevorzugten Böden sind schwer, zeitweise feucht, gut gedüngt und über kalkhaltigem Untergrund. Da es sich um ein Futtergras von sehr hohem Futterwert handelt, wird er auch häufig angesät.

WIRKUNG

Die Horste sind trittfest und somit ist der Wiesen-Schwingel auch ein gern gesehenes Weidegras. Im Futterpflanzenbau wird er oftmals auch mit anderen Arten verkreuzt, die wiederum als Futtergräser genutzt werden. Diese Hybride sind aber zumeist an intensive Bewirtschaftung gebunden und in einer herkömmlichen Wirtschaftswiese nicht konkurrenzkräftig und verschwinden wieder.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Fundort
												Feuchtwiese

Wilde Karotte / *Daucus carota*



daukos *griech.* Pastinak oder Möhre
carota *lat.* Karotte
Familie Doldengewächse/Apiaceae
Futtertyp Kräuter

BESCHREIBUNG

Die Wilde Karotte ist eine zweijährige Pflanze mit einer tiefwurzelnden weiblichen Speicherwurzel. Sie erreicht Wuchshöhen von 20 bis 120 cm. Die Blätter sind zwei- bis vierfach gefiedert und wie der Stängel dicht borstig behaart. Die Blüten dolden sind vielstrahlig und zur Blütezeit flach ausgebreitet. Nach der Blüte sind sie in der Form eines Vogelnestes zusammengezogen. Die am Rand der Dolde stehenden Blüten sind oft mit unregelmäßig vergrößerten Blütenblättern besetzt, die die Attraktivität für allfällige Bestäuber erhöhen sollen. In der Mitte der Dolde sitzt eine durch Farbstoffe (Anthocyane) schwärzliche sterile Blüte, die „Mohrenblüte“. Die Dolden und einzelnen Döldchen sind von gefiederten Hüllblättern umgeben.

VORKOMMEN

Die Wilde Karotte kann man in eher basenreichen, mageren und trockenen Wiesen und deren Randbereichen finden.

WIRKUNG

Sie ist eine der Elternarten der Echten Karotte, die Rübe ist allerdings sehr zäh und schmeckt scharf. Das Kraut besitzt einen mäßigen Futterwert. Die Blüten sondern reichlich Nektar ab und sind aus diesem Grund für Blütenbesucher besonders attraktiv. Das Kraut ist die wichtigste Futterpflanze der Raupe des Schwalbenschwanzes.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Fundort
												Trockenwiese

Wolliges Honiggras / *Holcus lanatus*



Holcus die Herkunft der Bezeichnung ist unklar
lanatus *lat.* wollig
Familie Süßgräser/Poaceae
Futtertyp Gräser

BESCHREIBUNG

Das Wollige Honiggras ist ein mehrjähriges, in dichten Horsten wachsendes Gras. Es wird bis zu 100 cm hoch. Die Halme sind am Grund oft geknickt und dicht samtig behaart, ebenso wie die Blattscheiden und die Hüllspelzen. Die Blütenrispe ist rotviolett überlaufen und während der Blüte weit ausgebreitet. Vor dem Aufblühen und im Anschluss an die Blüte zieht sie sich zusammen.

VORKOMMEN

Das Wollige Honiggras ist ein sehr häufiges Wiesengras bis in mittlere Lagen, gerne auf stickstoffhaltigen und schwach sauren Böden. Es ist eine Charakterart der europäischen Wirtschaftswiesen.

WIRKUNG

Der Futterwert ist mäßig, die Pflanzen werden vom Vieh nur im jungen Zustand gerne gefressen und eher schlecht verdaut.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Feuchtwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Fundort

Zaun-Wicke / *Vicia sepium*



vincire *lat.* winden
sepium *lat.* Zaun
Familie Schmetterlingsblütler/Fabaceae
Futtertyp Leguminosen

BESCHREIBUNG

Die Zaun-Wicke ist eine ausdauernde, krautige Pflanze. Sie wird ca. 30 - 60 cm hoch. Der kantige Stängel trägt wechselständig angeordnete, gefiederte Blätter. Jedes Blatt besteht aus 4 - 8 Paaren von länglich-eiförmigen bis fast rundlichen Fiederblättchen und einer endständigen, oft verzweigten Ranke. Die Nebenblätter tragen unterseits ein Nektarium, das dunklen Nektar absondert. Die 12 - 15 mm langen Blüten sind zu kleinen, kurz gestielten Büscheln mit je 2 - 6 Blüten in den Blattachseln angeordnet. Die typisch schmetterlingsförmigen Blütenkronen sind bläulich-lila bis trüb purpurviolett. Die reifen Hülsen sind glänzend schwarz.

VORKOMMEN

Die Zaun-Wicke ist häufig in nährstoffreichen Fettwiesen, an Weg- und Äckerrändern von der Ebene bis in den Bereich der Waldgrenze zu finden.

WIRKUNG

Die Zaun-Wicke ist eine gute Futterpflanze. Der Nektar am Grund der Blütenkronen kann nur von kräftig gebauten Hummel-Arten erreicht werden. Weniger robuste Insekten beißen sich seitlich Zugänge und begehen Nektarraub, ohne die Blüten zu bestäuben. Diese seitlichen Zugänge werden dann auch von anderen Insekten wie etwa Bienen benützt. Die Nektarien an der Unterseite der Nebenblätter werden von Ameisen besucht.

Hauptblütezeit

JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	Trockenwiese
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Fundort

Quellenverzeichnis

DÜLL, R., KUTZELNIGG, H. (1992): Botanisch-ökologisches Exkursions-taschenbuch. 4. Aufl., Quelle & Meyer.

ELLENBERG, H. (1996): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 5. Aufl., Ulmer Verlag.

FISCHER, M., OSWALD, K., ADLER, W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein, Südtirol. 3. Aufl., Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen.

GENAUST, H. (2005): Etymologisches Wörterbuch der Botanischen Pflanzennamen. 3. Aufl., Nikol Verlag.

HABERMICHL, G., ZIEMER, G. (1999): Mitteleuropäische Giftpflanzen und ihre Wirkstoffe. Springer Verlag.

KLAPP, E., OPITZ, V., BOBERFELD, W. (2004): Gräserbestimmungsschlüssel für die häufigsten Grünland- und Rasengräser. 5. Aufl., Ulmer Verlag.

KLAPP, E., OPITZ, V., BOBERFELD, W. (2004): Kräuterbestimmungsschlüssel für die häufigsten Grünland- und Rasenkräuter. 4. Aufl., Ulmer Verlag.

MERTZ, P. (2002): Pflanzenwelt Mitteleuropas und der Alpen. Erkennen, Bestimmen, Bewerten. Ein Handbuch für die vegetationskundliche Praxis. 2. Aufl., Nikol Verlag.

ROTH, L., DAUNDERER, M., KORMANN, K. (1994): Gift-Pflanzen-Gifte. Vorkommen, Wirkung, Therapie, allergische und phototoxische Reaktionen. 4. Aufl., Nikol Verlag.

SCHÖNFELDER, I. & P. (2010): Der Kosmos Heilpflanzenführer. Über 600 Heil- und Giftpflanzen Europas. Kosmos Verlag.

SCHUBERT, R., HILBIG, W., KLOTZ, S. (2001): Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Deutschlands. Spektrum Verlag.

Glossar

Blüte/Blütenmerkmale

Bei einer Blüte handelt es sich um einen Kurzspross mit begrenztem Wachstum, der im Dienste der Fortpflanzung steht. Das heißt, es handelt sich um einen stark verkürzten Sprossabschnitt, der mit der Blütenbildung sein Wachstum einstellt und der die geschlechtlichen Fortpflanzungszellen enthält. Neben den bedecktsamigen Pflanzen, die man üblicherweise im allgemeinen Sprachgebrauch als „Blütenpflanzen“ bezeichnet, erfüllen diese Definition auch Bärlappgewächse, Schachtelhalm und Nachtsamer (u. a. Nadelbäume). Hier wird nur auf die Blüten der Bedecktsamer Bezug genommen.

Blütenbau

Eine typische Blüte weist drei verschiedene Abschnitte (Blütenglieder) auf, von unten (außen) nach oben (innen) sind dies:

- Blütenhülle
- Staubblätter
- Fruchtblätter

Zwitterblüte: eine Blüte enthält Staubblätter und Fruchtblätter

Eingeschlechtige Blüte: eine Blüte enthält nur Staubblätter oder nur Fruchtblätter

Einhäusig: eine Pflanze trägt nur eingeschlechtige Blüten, jedoch männliche und weibliche Blüten auf derselben Pflanze

Zweihäusig: eine Pflanze trägt nur männliche oder nur weibliche Blüten, es gibt also männliche und weibliche Individuen

Tierbestäubung: Pollentransport erfolgt durch Tiere; typische Anpassungen sind unter anderem Nektarabsonderung, zygomorphe Blüten oder Spornbildungen

Windbestäubung: Pollentransport erfolgt durch den Wind; damit verbunden sind typischerweise Anpassungen wie Reduktion bzw. völliger Verlust der Blütenhülle; langgestielte Staubblätter; oft hängende und pendelnde Staubblätter (z. B. Süßgräser) oder Blütenstände (Kätzchen wie bei Erle, Birke, Hasel); Narben oft gefranzt oder federig

Blütenhülle: äußerer (unterer) Teil der Blüte; die Blütenhülle hat Schutzfunktion und die Aufgabe, Blütenbesucher anzulocken

Einfache Blütenhülle (Perigon): Blütenhüllblätter untereinander weitgehend gleich gefärbt und gestaltet

Doppelte Blütenhülle (Perianth): die Blütenhülle weist zwei deutlich unterscheidbare Kreise (Kelch und Krone) auf

Kelch: äußerer, meist kleinerer und ± grüner Teil der Blütenhülle bei Vorliegen eines doppelten Perigons

Krone: innerer, meist größerer und gefärbter Kreis der Blütenhülle bei Vorliegen eines doppelten Perigons

Staubblatt: männlicher Teil der Blüte, bestehend aus Staubfaden (Filament) und Staubbeutel (Anthere); im Staubbeutel wird der Blütenpollen gebildet

Fruchtblatt: weibliches und zugleich innerstes Blütenglied, bestehend aus Fruchtknoten, Griffel und Narbe – gemeinsam bilden sie den Stempel; im Fruchtknoten sitzen die Samenanlagen, die sich nach erfolgreicher Befruchtung zum Samen weiterentwickeln

Blütensymmetrie: gibt an, wie viele Symmetrieebenen durch eine Blüte gelegt werden können; zur Beurteilung schaut man zentral in die Blüte

Radiärsymmetrische Blüten: drei oder mehr Symmetrieebenen pro Blüte sind möglich

Bisymmetrische Blüten: zwei Symmetrieebenen pro Blüte sind möglich

Zygomorph (monosymmetrisch): nur eine Symmetrieebene pro Blüte ist möglich

Zweilippig: zygomorphe Blüten mit vor allem in der Seitenansicht erkennbarer Ober- und Unterlippe

Zungenblüten: Blütentyp bei Korbblütlern; die verwachsenen Kronen sind vorne einseitig, „zungenförmig“ ausgezogen; Vorderende oft seicht, drei- oder fünfzählig

Röhrenblüten: Blütentyp bei Korbblütlern; die verwachsenen Kronen sind vorne in fünf sternförmig auseinanderpreizende Kronzipfel aufgespalten

Nektarblätter: kronblattartig aussehende Blütenorgane, die Nektardrüsen (meist am Grund) tragen

Nektardrüsen: Nektar absondernde Zellen oder Zellgruppen; meist im Bereich der Blüte, selten auch außerhalb

Granne: borstenförmiger Fortsatz an den Deckspelzen von Süßgräsern

Blütenstände

Die Blüten sind nicht einzeln am Ende des Stängels, sondern zu mehreren bis sehr vielen am Ende unterschiedlich stark verzweigten Sprossabschnitten angeordnet. Bei Gräsern und Korbblütlern werden dieselben Begriffe verwendet, um die Anordnung der Ährchen oder Körbe zu beschreiben.

Traube: Blütenstand mit ± langgestreckter Hauptachse; Blüten auf ± langen, unverzweigten Stielen (z. B. Kreuzblütler)

Ähre: Blütenstand mit ± langgestreckter Hauptachse; Blüten völlig ungestielt

Ährenrispe: Blütenstand mit rispenartiger Verzweigung, jedoch mit sehr kurzen, oft erst nach „Umbiegen“ erkennbaren Ästen, daher vordergründig ährenartig (Süßgräser/ Ährenrispengräser)

Dolde: Blütenstand mit stark gestauchter Hauptachse, daher Blütenstiele (Doldenstrahlen) alle „aus einem Punkt“ entspringend; Oberfläche des Blütenstandes schirmförmig bis halbkugelig

Doppeldolde: zusammengesetzte Dolde; statt der Blüten nochmals doldenartig verzweigte Doldenstrahlen (z. B. Doldenblütler)

Döldchen: blütentragende Dolden bei Doppeldolden

Zweigabeliger (dichotomer)

Blütenstand: ohne durchgehende Hauptachse; die Hauptachse des Blütenstandes schließt das Wachstum mit der Blütenbildung ab; zwei Seitenäste übernehmen die Fortführung (z. B. Nelkengewächse)

Frucht/Fruchtmerkmale

Die Frucht stellt den Zustand des Fruchtknotens (der Blüte) zum Zeitpunkt der Samenreife dar. Je nachdem, ob sich die reifen Früchte öffnen (Öffnungsfrüchte) oder nicht (Schließfrüchte), nach Art und Weise der Öffnung sowie ob die Fruchtwand ganz oder teilweise saftig-fleischig wird, werden unterschiedliche Fruchttypen unterschieden.

Windverbreitung: Frucht-/Samenverbreitung erfolgt durch den Wind

Hülse: Öffnungsfrucht aus einem Fruchtblatt; Öffnung zweiseitig entlang der Bauch- und Rücken-nahrt; typische Frucht der Schmetterlingsblütler (Hülsenfrüchtler)

Rispe: Blütenstand mit ± langgestreckter Hauptachse; Blüten auf verzweigten Stielen; Verzweigungsgrad im Blütenstand von unten nach oben abnehmend

Köpfchen: Blütenstand scheibenförmig bis kugelig mit dichtgedrängten, sitzenden Blüten

Korb: Blütenstand scheibenförmig verbreitert, flach bis gewölbt; meist viele dichtgedrängte Blüten tragend; außen von einer Hülle aus Hochblättern umgeben (z. B. Korbblütler)

Balg: Öffnungsfrucht aus einem Fruchtblatt; Öffnung einseitig entlang der Bauchnaht; unter anderem Hahnenfußgewächse

Nuss (Nüsschen): Schließfrucht; die gesamte Fruchtwand ist trockenhäutig bis holzig-hart

Kapsel: Öffnungsfrucht aus zwei oder mehr verwachsenen Fruchtblättern; Öffnung sehr unterschiedlich, jedoch nicht wie bei der Schote von unten nach oben; nach Art und Weise der Öffnung werden mehrere Kapseltypen unterschieden (Poren-, Deckel-, Zahne-, Spalt- oder Zerfallskapseln); Kapsel Früchte sind in vielen Pflanzenfamilien verbreitet

Blatt/Blattmerkmale

Der Spross einer Blütenpflanze weist mehrere Blatttypen auf: Von unten nach oben sind dies unter anderem Keimblätter, Laubblätter, Hochblätter, Blütenblätter. Die im Folgenden aufgeführten Merkmale beziehen sich auf die Laubblätter.

Blattstiel: stielartiger Teil des Blattes, nicht bei allen Gruppen ausgebildet; insbesondere fehlend bei lilien- und grasähnlichen Pflanzen

Blattspreite: Blattfläche, flächenartiger Anteil des Blattes; die Form ist sehr variabel

Ungeteiltes Blatt: die Blattspreite weist keine tieferen Einschnitte auf, kann aber am Rand gezähnt, gesägt oder gekerbt sein

Geteiltes Blatt: die Blattspreite weist mehr oder weniger tiefe Einschnitte auf (eingeschnitten oder gelappt, z. B. Ahorn, Eiche)

Zusammengesetztes Blatt: die Einschnitte der Blätter reichen bis zu den Hauptnerven der Blätter, das heißt, die Blattspreite ist aus voneinander getrennten Teilblättern aufgebaut (z. B. Rosskastanie, Esche)

Gefiedertes Blatt: zusammengesetztes Blatt mit klar erkennbarer Hauptachse und ein bis mehreren Paaren seitlicher Teilblättchen (z. B. Esche)

Gefingertes Blatt: zusammengesetztes Blatt ohne erkennbare Hauptachse; alle Teilblätter entspringen einem Punkt (z. B. Rosskastanie)

Nebenblätter: meist kleine, unterschiedlich gestaltete Anhängsel an oder in der Nähe der Basis des Blattstieles; nicht bei allen Gruppen vorhanden; typisch unter anderem für Rosengewächse oder Schmetterlingsblütler

Ranke: zu Kletterorgan umgewandelter Stängelabschnitt (Sprossranke, z. B. Wein) oder Blattabschnitt (Blattranken, z. B. Wicke, Erbse, Bohne)

Blattstellung: gibt die Anordnung der Blätter entlang der Sprossachse an

Wechselständig: pro Knoten ein Blatt, das heißt, die Blätter sitzen jeweils einzeln am Stängel (z. B. Hahnenfußgewächse, Rosengewächse, Schmetterlingsblütler)

Gegenständig: pro Knoten zwei gegenüberstehende Blätter (z. B. Nelkengewächse, Kardengewächse)

Wirtelig: pro Knoten drei oder mehr Blätter in einem Wirtel/Kranz (z. B. Rötengewächse)

Zweizeilig: wie wechselständig, jedoch Blätter jeweils genau um 180° versetzt (z. B. Süßgräser)

Kreuzgegenständig: wie gegenständig, jedoch Blattpaare immer um genau 90° versetzt (z. B. Lippenblütler)

Spelze: trockenhäutiges, schuppenförmiges Blättchen in den Ährchen von Süßgräsern

Ochrea: zu einer Tüte verwachsene Nebenblätter der Knöterichgewächse; sie umgeben den Stängel oberhalb der Knoten scheidenförmig

Weitere Merkmale

Rhizom: unterirdischer, meist zumindest etwas verdickter Sprossabschnitt; dient als Speicherorgan

Rosette: gestauchter Sprossabschnitt mit sehr dicht aufeinanderfolgenden Blättern; meist als Grundrosette (Löwenzahn, Wegerich), seltener als Stängelrosette (Windröschen)

Rosettenpflanze: Pflanze mit Grundrosette; Stängel völlig blattlos, schaftartig

Halbrosettenpflanze: Pflanze mit Grundrosette; mit Bildung des Blühtriebes „löst“ sich diese ± auf und der Blühtrieb ist beblättert

Stauende: ausdauernde, nicht verholzte (krautige) Pflanze

Krautig: alle nicht verholzten Pflanzen, weichlaubig

Öhrchen: unterschiedlich gestaltete Anhängsel am Grund der Blattspreite oder des Blattstieles; häufig den Stängel teilweise oder ganz umfassend

Kräuter:

- a) wird für einjährige, üblicherweise nicht grasartige Pflanzen verwendet
- b) im Zusammenhang mit Futterpflanzen: alle krautigen, mit Ausnahme von Gräsern und Leguminosen

Hüllblätter (Hülle): meist stark vereinfachte, oft schuppenförmige Hochblätter, die Einzelblüten oder Blütenstände einhüllen (Korb)

Halbschmarotzer: Pflanze, die einerseits selbst Photosynthese betreibt, gleichzeitig aber auch auf anderen Pflanzen parasitiert

Wurzelknöllchen: kleine, ± kugelige bis walzenförmige Verdickungen der Wurzeln; darin sind symbiontische Wurzelbakterien (Rhizobien) enthalten (Schmetterlingsblütler)

Öldrüsen: ätherische Öle absondernde Zellen oder Zellgruppen

Pflanzenverzeichnis

A

**Acker-Witwenblume,
Wiesenskabiose**
Knautia arvensis 28

Arznei-Quendel, Feld-Thymian
Thymus pulegioides 29

E

Echter Kümmel
Carum carvi 30

Echt-Labkraut
Galium verum 31

Echt-Wundklee
Anthyllis vulneraria 32

Eigentliche Kartäuser-Nelke
Dianthus carthusianorum 33

Englisches Raygras, Dauer-Lolch
Lolium perenne 34

Europäische Trollblume
Trollius europaeus 35

F

Frauenmantel-Arten
Alchemilla-Arten 36

G

Gemeine Schafgarbe
Achillea millefolium 37

Gemeines Ruchgras
Anthoxanthum odoratum 38

Gewöhnliche Blasen-Lichtnelke
Silene vulgaris 39

**Gewöhnlicher Glatthafer,
Französisches Raygras**
Arrhenaterum elatius 40

Gewöhnlicher Wiesen-Augentrost

Euphrasia officinalis ssp.
rostkoviana 41

Gewöhnliches Knäuelgras
Dactylis glomerata 42

Gewöhnliche Kuckucksnelke
Lychnis flos-cuculi 43

Große Bibernelle
Pimpinella major 44

Großer Wiesen-Bocksbart
Tragopogon orientalis 45

Großer Wiesenknopf
Sanguisorba officinalis 46

Gundermann
Glechoma herderacea 47

H

Herbst-Zeitlose
Colchicum autumnale 48

K

Kleiner Klappertopf
Rhinanthus minor 49

**Kleines und Großes
Wiesen-Labkraut**
Galium album, Galium mollugo 50

**Klein-Pfeifengras,
Blaues Pfeifengras**
Molinia caerulea 51

Kohl-Kratzdistel
Cirsium oleraceum 52

L

Löwenzahn
Taraxacum officinalis agg. 53

M

Mädesüß
Filipendula ulmaria 54

R

Rauer Löwenzahn
Leontodon hispidus
ssp. hispidus 55

Rot-Klee
Trifolium pratense 56

S

Scharfer Hahnenfuß
Ranunculus acris 57

Schlangen-Knöterich
Persicaria bistorta 58

Skabiosen-Flockenblume
Centaurea scabiosa 59

Spitz-Wegerich
Plantago lanceolata 60

Stumpfbblatt-Ampfer
Rumex obtusifolius 61

Sumpf-Dotterblume
Caltha palustris 62

V

Vogel-Wicke
Vicia cracca 63

W

Wiesen-Bärenklau
Heracleum sphondylium 64

**Wiesen-Esparsette,
Futter-Esparsette**
Onobrychis viciifolia 65

Wiesen-Fuchsschwanzgras
Alopecurus pratensis 66

Wiesen-Goldhafer
Trisetum flavescens 67

Wiesen-Hornklee
Lotus corniculatus 68

Wiesen-Kerbel
Anthriscus sylvestris 69

Wiesen-Lieschgras
Phleum pratense 70

Wiesen-Pippau
Crepis biennis 71

Wiesen-Platterbse
Lathyrus pratensis 72

Wiesen-Salbei
Salvia pratensis 73

Wiesen-Schwingel
Festuca pratensis 74

Wilde Karotte
Daucus carota 75

Wolliges Honiggras
Holcus lanatus 76

Z

Zaun-Wicke
Vicia sepium 77

Impressum

Alle Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengetragen, jedoch kann für den Inhalt und die Richtigkeit keinerlei Gewähr übernommen werden. Nachdruck, auch auszugsweise verboten.

Herausgeber und Medieninhaber

ARGE Heumilch
Alle Rechte vorbehalten.

Verlags- und Herstellungsort

Innsbruck

Wissenschaftliche Mitarbeit

Univ.-Ass. Prof. Dr. Konrad Pagitz,
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck,
Institut für Botanik

Fotos

ARGE Heumilch, Beat Brechbühl, Fotolia,
ORF, Shutterstock, Thomas Sendelhofer,
TVB Erste Ferienregion im Zillertal
(Wörgötter&friends), Vorarlberg Tourismus



Entdecken Sie die ganze Welt der Heumilch!

Tauchen Sie in die Heumilch-Welt ein und entdecken Sie in unseren zahlreichen Broschüren allerlei Wissenswertes über die einzigartige Heuwirtschaft.

Rezepte

Köstliche Gerichte, die einfach nachzukochen sind, finden Sie in unseren zahlreichen Rezeptheften, die sich unterschiedlichen Schwerpunkten, wie zum Beispiel vegetarischer Ernährung oder Rezepten für Kinder, widmen.

Fibeln

Den Lebensraum der Heumilchkühe und die positiven Einflüsse der Heuwirtschaft auf Mensch und Natur kann man in den verschiedenen Fibeln entdecken.

Kinder

Spannende Abenteuer können die jüngsten Leser mit den Kinderbüchern erleben und lernen dabei auf spielerische Weise das Leben rund um die Heumilch kennen.

*Alle Broschüren können auf
www.heumilch.at
kostenlos bestellt werden.*



*Schicken Sie uns doch
Ihr Lieblingsrezept mit
Heumilchprodukten an
office@heumilch.at.*

*Und weil wir finden, dass
Wertvolles mit guten Freunden
geteilt werden sollte, finden Sie
eine Auswahl unserer Rezepte
auf Pinterest, Instagram und
unserer Facebook-Seite.*



Heumilch

EINFACH URGUT.

■ Artgemäße Fütterung im Jahresverlauf: Heumilchkühe bekommen frische Gräser und Kräuter im Sommer sowie Heu im Winter.

■ Vergorene Futtermittel sind strengstens verboten.

■ Zum Wohl der Tiere ist eine dauernde Anbindehaltung verboten. Für ausreichend Bewegung sorgen Laufställe, Auslauf oder Weide.

■ Die traditionelle Wirtschaftsweise der Heumilchbauern schützt die Umwelt und fördert die Artenvielfalt.

■ Heumilch ist aufgrund ihrer hohen Qualität für die Herstellung von Käsespezialitäten geeignet.

■ Heumilch ist kontrolliert gentechnikfrei und wird von unabhängigen Kontrollstellen zertifiziert.

■ Die Heuwirtschaft wurde von der Europäischen Union mit dem EU-Gütesiegel g.t.S. – garantiert traditionelle Spezialität – ausgezeichnet.



Herausgeber und Medieninhaber

ARGE Heumilch
Grabenweg 68
A-6020 Innsbruck
office@heumilch.at

Verlags- und Herstellungsort

Innsbruck

www.heumilch.com

